

Die Libellulidengattungen von Afrika und Madagaskar

von F. Förster.



Die zoologische Erforschung des dunklen Erdteils schreitet in unsern Tagen mit Riesenschritten vorwärts. Mit der Erwerbung gewaltiger Länderstrecken in Afrika haben auch wir Deutsche die Pflicht übernommen, die wissenschaftliche Untersuchung des genannten Erdteils nach Kräften zu fördern.

Was die Kenntnis der afrikanischen Säugetiere anbelangt, so beginnt sich bereits die Verbreitung der Arten und Rassen von einem zoogeographischen Bezirk zum andern zu klären, von den Glanzpunkten der afrikanischen Tierwelt, Gorilla, Okapi u. a. bis herab zu den kleinen Nagetieren der Wüsten und Steppen, besonders Dank der unermüdlichen Arbeit Paul Matschies am Königl. Museum für Naturkunde zu Berlin. Auch die Kenntnis der Ornithologie ist von deutscher Seite seit langen Jahren wesentlich gefördert worden, so von Reichenow, Voeltzkow, von Berlepsch, von Erlanger und andern. Es sei hier nur an die grosse, hauptsächlich ornithologische Zwecke halber unternommene zweijährige Expedition Carlos von Erlanger durch die Gallaländer und das im Aufstande befindliche Somaliland erinnert. Auch die übrigen Wirbeltiere Afrikas werden bald hinreichend gekannt sein.

Unter den wirbellosen Lebewesen stehen die Insekten an erster Stelle, und es ist beispielweise aus grossen Gebieten an Macrolepidopteren kaum mehr etwas neues zu erwarten. Viele Autoren sind an der Arbeit, die bunte Welt der afrikanisch-madagaskischen Coleopterenformen zu sammeln, zu sichten und zu ordnen, darunter als einziger aus unserer engeren Heimat der Curculionidenkenner

Fritz Hartmann in Fahnau i. Wiesenthal. Etwas weniger gut sind bisher die Libellen weggekommen, hauptsächlich weil diese schöne und interessante Insektengruppe von den Reisenden und Sammlern zu wenig berücksichtigt wird. Allerdings ist es schwer, viele dieser Tiere zu erbeuten, da sie vermöge ihrer ungeheuren Lebensenergie, die sich bei hoher Temperatur in einem rasenden Fluge betätigt, eines jeden Fangversuches spotten. Dazu kommt der oft fieberschwangere, totbringende Tummelplatz dieser Insekten über unzugänglichen Sümpfen und Morästen oder weit draussen auf der Wasseroberfläche der Seen und Ströme. Aber auch hier rinnt und tröpfelt es beständig, und eine neue Art und Gattung reiht sich, wenn auch langsam, an die andere. So habe ich es an der Zeit gehalten, die Libellengattungen Afrikas und Madagaskars übersichtlich zu behandeln, soweit sie mir bis heute bekannt geworden sind. Es wurden bereits 2 Versuche gemacht, die Libellengattungen in einem System darzustellen, und habe ich mich in der Hauptsache an diese Arbeiten von der Hand W. F. Kirbys vom britischen Museum und F. Karschs vom kgl. Museum zu Berlin angelehnt, des letzteren Arbeit im wesentlichen zu grunde legend. Was aber die Verwendung der dort gegebenen Merkmale anlangt, so bin ich des öfters meine eigenen Wege gegangen, da sich manche von den früheren Autoren benützte Charaktere als bis zu einem gewissen Grade variabel und daher irreführend herausgestellt haben. Ohne den Anspruch zu erheben, ein rein natürliches System der afrikanischen Libelluliden geschaffen zu haben, hoffe ich doch, einzelne Formen mit ihren nächst verwandten Gattungen in Verbindung gebracht zu sehen, (so z. B. *Chalcostephia* Kirby und *Hemistigmoides* Calvert.) Anhangsweise sei ferner die Aufstellung einiger neuer Gattungen und Arten hauptsächlich aus der Fauna von Deutsch-Ostafrika gegeben.

Bretten, im Dezember 1905.

Der Verfasser.

1. Übersicht der afrikanisch-madagassischen Libellulidengattungen.

Flügel beim ♂ am Analrand gerundet, nicht ausgerandet. Die Cardinalzelle in Vorder- und Hinterflügel in Grösse wesentlich verschieden, im allgemeinen dreieckig. Augen innen angrenzend, in der Regel (mit zwei Ausnahmen) aber nur kurz (auf $\frac{1}{3}$ der inneren Augennaht) = **Libellulidae**.

1. Ordnung. Augen auf mehr als zwei Drittel ihres Innenrandes angrenzend. (Augennaht lang.)

a) Nodalsector erst gerade, dann nach vorn leicht convex. Abdomen beim ♂ an der Basis eiförmig aufgeblasen, dann verjüngt, dann wieder etwas verdickt vor dem Ende

= 1. *Zyxomma* Ramb. Ins. Neuropt. 1842. pg. 30.

b) Nodalsector erst gerade, dann nach hinten leicht convex. Abdomen beim ♂ aus etwas aufgeblasener Basis bis zum Ende gleichmässig verschmälert

= 2. *Tholymis* Hagen Stettin. entom. Zeit. 1867. XXVIII. pg. 221.

2. Ordnung. Augen auf höchstens ein Drittel ihres Innenrandes angrenzend. (Augennaht kurz)

= Ächte Libelluliden.

1. Unterordnung. Cardinalzelle (Discoidaldreieck), im Vorderflügel normal dreiseitig, die vordere Seite also ganz gerade oder nur sehr nahe an der einen oder andern Ecke etwas geknickt oder gebrochen = **Trigonales**.

2. Unterordnung. Cardinalzelle mit sehr deutlich gebrochener Vorderseite, sodass das Discoidaldreieck deutlich unregelmässig vierseitig wird = **Nannophyae**.

1. Trigonales.

1. Abteilung. Denkt man sich die Aussenseite des Dreiecks (der Cardinalzelle) im Vorderflügel nach hinten verlängert, so geht diese Gerade 1—2 und mehr

Antenodalzellängen entfernt an der Aussenecke des Dreiecks im Hinterflügel vorbei = **Divergentes**.

2. Abteilung. Die Verlängerung der Aussenseite im Dreieck des Vorderflügels trifft die Aussenecke des Dreiecks im Hinterflügel mehr/minder genau oder schneidet das Discoidaldreieck = **Coincidentes**.

Zur Prüfung, ob eine Libelle zu den divergenten oder coincidenten Formen gehört, ist eine gute Spannung der Flügel notwendig, die Flügelmuskeln müssen vor der Präparation genügend erweicht sein, Costalrand des Hinterflügels und Hinterrand des Vorderflügels sollen ungefähr in einer zur Längsrichtung Senkrechten sich berühren. Zu stark nach aussen und vorn gehobene Vorderflügel ergeben irrtümlich divergente Dreiecke. Doch ist auch die Gattung Hemistigmoides, welche der Abteilungs-Grenze sehr nahe steht, bei richtiger Präparation noch deutlich in ihrer Stellung zu erkennen. Die einzige etwas unklare Gattung Palpopleura unterscheidet sich von allen Libellengattungen leicht durch den welligen Costalrand der Vorderflügel.

Divergentes.

1. Gruppe. Costalrand des Vorderflügels ziemlich gerade, nicht in der Mitte zwischen Nodus und Flügelbasis ausgebuchtet.

A) Nodal sector auf der Mitte sehr stark nach hinten convex

= 3. Pantala Hagen. Neuropt. of N. America
1860. pg. 141.

B) Nodal sector auf der Mitte gerade oder sehr schwach nach vorn convex.

a) Innenseite des Dreiecks im Vorderflügel genau parallel der Längsaxe des Körpers. Vorderseite des Dreiecks ungefähr 3mal in der Innenseite enthalten

= 4. Tramea Hagen. Neuropt. of N. America
1861. pg. 143.

- b) Innenseite des Dreiecks im Vorderflügel deutlich schräg von vorn und innen nach hinten und aussen gerichtet; Vorderseite des Dreiecks im Vorderflügel höchstens zweimal in der Innenseite enthalten.
- b1) Im Vorderflügel hinter dem von der vordern Aussenecke des Dreiecks abgehenden Sector (*S. brevis*) ein Hilfssector. Flügel teilweise opak. Hinterflügel an der Basis mindestens doppelt so breit als im Niveau des Pterostigmas. Pterostigma einfarbig
= 5. *Rhythemis* Hagen. Stett. ent. Zeit. 1867. XXVIII. pg. 232. (Syn. *Compsothemis* Karsch Entom. Nachricht. XV. 1889. N. 17. pg. 276—277).
- b2) Im Vorderflügel hinter dem von der Aussenecke des Dreiecks abgehenden Sector (*S. brevis*) kein Hilfssector. Hinterflügel an der Basis höchstens $1\frac{1}{2}$ so breit als im Niveau des Pterostigmas. Letzte Antenodalquerader nicht verlängert. Prothoraxmittellappen fast rechteckig, nicht herzförmig. Pterostigma meist zweifarbig = C.
- C) Hilfssector hinter dem Subnodalsector im Vorderflügel stark convex nach hinten, mit zwei Reihen Zellen zwischen beiden Sektoren. Aussenseite des Dreiecks von vorn und aussen schräg nach hinten und innen, doch die Aussenecke des Dreiecks im Hinterflügel in der Verlängerung nicht mehr schneidend.
- d) Flügelrand vorn wellig, d. h. in der Mitte zwischen der Basis und dem Nodus ausgebuchtet. — Pterostigma schwarz, in der inneren Hälfte weissgelb
— 6. *Palpopleura* Ramb. Ins. Neuropt. 1842. pg. 129.

d1) Flügelrand vorn zwischen Flügelbasis und Nodus ungefähr gerade, nicht ausgebuchtet. Pterostigma schwarz, in der Mitte weiss

= 7. Hemistigmoides Calvert Proceedings of the Academy of Nat. Sciences of Philadelphia 1899. pg. 239.

C1) Hilfssector hinter dem Subnodalsector im Vorderflügel gerade oder nur undeutlich convex nach hinten, sodass nur eine Zellreihe zwischen beiden Sektoren liegt.

e) Dreieck im Vorderflügel gerade nach hinten gerichtet, d. h. die Aussenseite des Dreiecks im Vorderflügel deutlich schräg von vorn und aussen nach hinten und innen gerichtet, die Verlängerung aber die Aussenecke des Dreiecks im Hinterflügel nicht mehr schneidend. 14—18 Antenodalqueradern.

f) Innenrand des Hinterflügels parallel der Längsaxe des Körpers, sehr lang, der Flügel an der Basis daher am breitesten, das Analfeld vor dem Arculus reich entwickelt (Postcostalraum von der Postcostalader bis zum Flügelrande 5 Zellen breit). Membranula ziemlich lang und schmal (2 Analzellen lang). Flügel ganz hyalin. Höchstens 14 Antenodalqueradern im Vorderflügel. Pterostigma in der basalen Hälfte meist weissgelb, in der äussern dunkel.

8. Hemistigma Kirby. Transactions of the zoolog. Soc. of London 1889. Vol. XII. pg. 295.

f1) Der Innenrand des Hinterflügels biegt sofort von der Längsaxe des Körpers weg nach hinten und aussen in sanftem Bogen. Das Analfeld vor dem Arculus daher nur 1—3 Zellen breit (Membranula wahrscheinlich klein und kurz). Flügel hyalin, im Subcostalraum

mit einer braunschwarzen Strichzeichnung.
 16—17 Antenodalqueradern im Vorderflügel.
 Pterostigma dunkel, doch oft, beim ♀ immer,
 die basale Hälfte des Pterostigmas weissgelb
 = 9. *Thermochoria* Kirby. Transactions of
 zool. Soc. of London. Vol. XII. part. 9.
 1889. pg. 295.

- e1) Dreieck im Hinterflügel schräg nach hinten
 und aussen gerichtet, d. h. die Aussenseite
 des Dreiecks im Vorderflügel eher schräg von
 vorn und innen nach hinten und aussen
 gerichtet, als von vorn und aussen nach
 hinten und innen. Nur 10 Antenodalquer-
 adern. Flügel hyalin. Pterostigma bisweilen
 am Rande dunkler als in der Mitte
 = 10. *Chalcostephia* Kirby. Transact. of
 zool. Soc. of London 1889. Vol. XII.
 pg. 293.

Coincidentes.

1. Abteilung. Die letzte Antenodalquerader ist nicht
 in den Subcostalraum verlängert.
2. Abteilung. Die letzte Antenodalquerader ist in den
 Subcostalraum verlängert.

1. Abteilung, Coincidentes mit nicht verlängerter Antenodalquerader.

1. Gruppe. Das Dreieck im Vorderflügel fast gleich-
 seitig, d. h. die innere (basiswärts gelegene) Seite
 etwas kürzer oder nur so lang, als die vordere Seite =
 Regulares.

Hierher gehört vielleicht als einzige afrikanische
 Gattung *Corduliops* Karsch. Diese Gattung fehlt
 mir, und da Karsch die Längenverhältnisse des Drei-
 ecks im Vorderflügel nicht näher erörtert, sondern nur

sagt »Dreieck breit«, so kann ich die Gattung nicht richtig stellen, vermute aber doch, dass sie zur folgenden Gruppe gehört, bei der die innere Seite des Dreiecks im Vorderflügel ungefähr 2mal so lang ist als die Vorderseite. Ich halte die Libelluliden mit regulärem Dreieck für sehr alte Formen. Solche mit nicht verlängerter Antenodalquerader sind äusserst selten und gewiss ihres einfachen Geäders halber sehr primitive Gattungen. Sicher hierher gehörige Arten fliegen in Neu-guinea, z. B. *Microtrigonia marsupialis* Foerster.

1. Abteilung, Coincidentes mit nicht verlängerter Antenodalquerader.

II. Gruppe:

Das Dreieck im Vorderflügel ungefähr gleichschenkelig, dabei die innere (basiswärts gelegene) Seite des Dreiecks im Vorderflügel länger ($1\frac{1}{2}$ —2 und mehr mal so lang) als die Vorderseite = Bilaterales (L).

L1) Wenige, 6—9 Antenodales, Formen mit einfacherem Geäder (Sympetrine Libelluliden).

L2) Viele, 10—14 und mehr Antenodalqueradern, Formen, welche in der Entwicklung des Kleingeäders weiter fortgeschritten sind.

L1) Wenige, 6—9 Antenodalqueradern. (Sympetrinae.)

a) Mittellappen des Prothoraxhinterrandes am Oberrand wagrecht, geradlinig begrenzt, nieder, unbehaart, in der Mitte nicht eingekerbt.

b) Prothoraxmittellappen rechteckig, Sectors arcuati lang gestielt, Nodalsector durchaus nicht wellig. Membranula im Hinterflügel kurz dreieckig. Stirn metallisch

= 11. *Corduliops* Karsch. Berlin. ent. Zeitschr. Bd. XXXIII. 1889. Heft II. pg. 374.

- b1) Prothoraxmittellappen stark trapezförmig, die Seiten des Trapezes sehr schräg von innen und oben nach aussen und unten gerichtet. Sectors arculi kurz gestielt (nur etwa ein Drittel der Länge der zweiten Antennodalzelle). Nodalsector im ersten Viertel gerade, im zweiten Viertel deutlich convex nach vorn und dann wieder gerade. Membranula lang (2—3 Analzellen lang), schmal dreieckig. Stirn unmetallisch

= 12. *Termitophorba* Foerster nov.
gen. Type *T. rufina* nov. sp. (Somaliland.)

- a1) Oberrand des Prothoraxmittellappens bogenförmig begrenzt, in der Mitte eingekerbt.

- c) Prothoraxmittellappen nieder, halbmondförmig, unbehaart, an der Basis breiter als in der obern Hälfte, oben in der Mitte schwach eingekerbt

= 13. *Cacergates* Kirby, Transact. of zoolog. Society of London. Vol. XII. Part. 9. 1889. pg. 306. (Syn. *Zonothrasys* Karsch. Stett. entom. Zeit. V. 51. 1890. pg. 297.)

- c1) Prothoraxmittellappen hoch und gross, lang bewimpert, an der Basis schmaler als in der obern Hälfte (d1).

- d1) Prothoraxmittellappen am Oberrand halbkreisförmig, in der Mitte schwach eingekerbt

= 14. *Acisoma* Ramb. Ins. Neuropt. 1842. pg. 28.

- d2) Prothoraxmittellappen in der Mitte stark eingeschnitten, oben viel breiter als unten, daher herzförmig.

- e) Vorderseite des Dreiecks im Vorderflügel halb so lang oder länger als die Innenseite. Vorderseite des Nebendreiecks so lang oder länger als die Innenseite des Hauptdreiecks (*Sectores trianguli* im Hinterflügel aus einem Punkt)
= 15. *Sympetrum Nervm.* Ent. Mag. 1833. pg. 511.
- e1) Vorderseite des Dreiecks im Vorderflügel nur ein Drittel so lang als die Innenseite, die Vorderseite des Nebendreiecks deutlich kürzer als die Innenseite des Hauptdreiecks (7—8 Antenodalqueradern im Vorderflügel, Nebendreieck ein- bis zweizellig, *Sectores trianguli* im Hinterflügel mehr-weniger getrennt am Ursprung).
- f) Ocellenwulst (Scheitelblase) von oben gesehen an der Vorderkante in der Mitte convex oder gerade, oben gewölbt. (Pterostigma gleichmässig gefärbt, Genitalanhang des 2. Segmentes teilweise lang und stark abstehend, z. B. der Hinterlappen)
= 16. *Diplacodes Kirby.* Transact. zool. Society of London. XII. pg. 263. 307. 1889.
- f1) Ocellenwulst von oben gesehen an der Vorderkante in der Mitte deutlich ausgebuchtet (concau), flacher. (Pterostigma an den beiden schmalen Seiten heller (weissgelb) als in der (braunen) Mitte. Genitalanhang des 2. Segmentes dicht anliegend, nicht hervortretend)
= 17. *Philonomon Foerster nov. gen.*
Type *Philonomon Erlangeri n. sp.*,
Somaliland.

L2) Viele, 10—14 und mehr Antenodalqueradern im Vorderflügel.

- a) Klauenzahn lang, im gleichen Niveau wie die Klauenspitze endend, oder kaum kürzer oder kaum länger als das Klauenende, bisweilen etwas schwächer, bisweilen sogar stärker als dasselbe. (Zygonydine Libelluliden.) Nodalsector im 2. Viertel nach vorn deutlich, wenn auch oft schwach convex

— 18. *Zygonyx* Selys-Grünberg. Hagen. Verhandl. d. k. k. zool. bot. Ges. Wien. XVII. 1867. pg. 58 und 62, De Selys-Longchamps Bull. Acad. Belg. 1871. XXXI. pg. 520. Grünberg. Zoolog. Jahrb. 18. Band. Heft 6. Jena 1903. pg. 718.

(*Pseudomacromia* Kirby Transact. of zoolog. Society of London 1889. XII. pg. 262 und 299, *Schizonyx* Karsch Berlin. Entomol. Zeit. 1889. Bd. XXXIII. 1889. Heft II. pg. 280. *Schizothemis* Sjöstedt Bihang T. K. Svenska Vet. Akad. Handlingar Bd. 25. Afd. IV. N. 2.)

- a1) Klauenzahn klein, höchstens ein Drittel so lang als das übrige Klauenende, das ihn um das zweifache seiner Länge überragt.

- b) Nodalsector einfach gebogen, keine Spur wellig. Prothoraxmittellappen gross, behaart, oben abgerundet, in der Mitte nicht eingekerbt

— 19. *Porpax* Karsch. Entom. Nachricht. Jahrgang XXII. No. 2. S. 17—21.

- b1) Nodalsector im zweiten Viertel nach vorn sehr schwach convex, sonst gerade, aber durchaus nicht wellig, sehr selten ganz

gerade. Prothoraxmittellappen klein, unbehaart, halbmondförmig, in der Mitte nicht eingekerbt.

- c) Sector superior trianguli meist kurz, im Niveau des Nodus endend, nach vorn stark convex, sodass der Discoidalraum in der Mitte etwas verschmälert erscheint. Plumpere, kräftigere Formen

=20. *Crocothemis* Brauer. Verhandlungen d. zool. bot. Gesellsch. Wien 1868. XVIII. pg. 367, 736. (*Apeleutherus* Kirby? *Annals and magaz. of Natur. History* 1900, Serie 7. Vol. VI. pg. 73. *Bebblecia* Kirby l. c. pg. 71.

- c1) Sector superior trianguli meist etwas länger als der Nodus, fast gerade, sodass der Discoidalraum in der Mitte nicht wesentlich verschmälert erscheint. Meist gracilere Formen

=21. *Trithemis* Brauer. Verhandl. d. zool. bot. Gesellsch. 1868. Wien. XVIII. pg. 176, 366, 735.

- b2) Nodalsector stark wellig (wie bei *Orthe-trum*). 14—17 Antenodalqueradern.

- d) Prothoraxmittellappen niedrig, viel breiter als hoch, unbehaart. Arculus zwischen der 2. und 3. Antenodalquerader

=22. *Apatelia* Karsch. Berlin. Entom. Zeitschr. 38. Bd. 1893. pg. 1—266.

- d1) Prothoraxmittellappen gross, nicht erheblich breiter als hoch (behaart?), 16—17 Antenodalqueradern

=23. *Olpogastra* Karsch. Entomolog. Nachricht. 1895. Jahrgang XXI. N. 13. S. 198—203.

2. Abteilung. Coincidentes mit in den Subcostalraum verlängerter letzter Antenodalquerader.

I. Gruppe. Das Dreieck im Vorderflügel fast gleichseitig, d. h. die innere (basiswärts gelegene) Seite etwas kürzer oder nur so lang als die vordere Seite

=Regulares (R.).

R1) Wenige (6) Antenodalqueradern im Vorderflügel (Formen mit einfachem Geäder)

=24. *Aethriamanta* Kirby. Transact. of zool. Society of London. XII. pg. 262, 283. 1889.
(*Dicranopyga* Karsch. Entom. Nachr. Jahrgang XXI. 1895. N. 13. pg. 198—203.

R2) Viele, 10—14 und mehr Antenodalqueradern im Vorderflügel, die Regulares mit mehr entwickeltem Kleingeäder (*Micromacromine* Libelluliden).

a) Die beiden Gabeläste des Sector inferior trianguli im Hinterflügel ungefähr in einer Geraden liegend, beide parallel dem Hinterrand und Strahl und Gegenstrahl bildend (nach *Allorrhizucha Preussi* Karsch). Im Discoidalfeld des Vorderflügels nur 3—5 Randzellen (*Sectores trianguli* im Vorderflügel aus einem Punkt entspringend)

=25. *Allorrhizucha* Karsch. Berl. Entom. Zeitschr. XXXIII. 1889. pg. 390.

a1) Die beiden Gabeläste des Sector inferior trianguli im Hinterflügel schneiden in der Verlängerung den Hinterrand und bilden eine normale Gabel, einen Winkel von ungefähr 90° einschliessend. Im Discoidalfeld des Vorderflügels 7—9 Marginalzellen

=26. *Neodythemis* Karsch s. ampl. Entomol. Nachr. XV. Jahrgang. 1889. Heft XVI pg. 252. Vorderhand mit zwei fraglichen Untergattungen.

- b) *Sectores trianguli* im Hinterflügel aus einem Punkt entspringend, Prothoraxmittellappen niedrig, breit, herzförmig (behaart?)

= 26a) *Micromacromia* Karsch. Berl. Entom. Zeitschrift. 1889. pg. 388. (Wohl Synonym zu 26b.)

- b1) *Sectores trianguli* sowohl im Vorderflügel als auch im Hinterflügel breit getrennt. Prothoraxmittellappen ziemlich gross, aufrecht, breit herzförmig, mit langen Wimpern behaart

= 26b) *Neodythemis* Karsch s. str. l. c. (Syn. *Oreoxenia* Foerster Entom. Nachr. 1899. pg. 186—191.)

- II. Gruppe der coincidenten Libelluliden mit verlängerter Antenodalquerader. Das Dreieck im Vorderflügel gleichschenkelig, dabei die innere Seite des Dreiecks im Vorderflügel länger ($1\frac{1}{2}$ —2 und mehr mal so lang als die Vorderseite)

= Bilaterales (L.).

L1) Wenige (6—7) Antenodalqueradern im Vorderflügel. (Einfache Formen.)

Abdomen aus breiter (nicht kugelig aufgeblasener) Basis nach hinten verschmälert. Hinterflügel in der Regel mit braungelbem Fleck

= 27. *Urothemis* Brauer, Verhandlung. der zool. bot. Gesellsch. Wien. XVIII. 1868. pg. 175, 366, 737.

L2) Viele, 10—14 und mehr Antenodalqueradern im Vorderflügel. (Im Kleingeäder entwickeltere Formen.)

- a) Nodalsector ziemlich gerade. 10—12 Antenodalqueradern im Vorderflügel.

- b) Prothoraxmittellappen ziemlich gross, oben breiter als an der Basis, am Oberrande

in der Mitte eingekerbt und daher herzförmig, langbewimpert, (Membranula eine Analzelle lang)

=28. *Atoconeura* Karsch. Entomolog. Nachrichten. XXV. 1899. pg. 371.

b₁) Prothoraxmittellappen sehr klein, mit gerundetem, in der Mitte nicht eingekerbtem Oberrand (kahl?)

=29. *Helothemis* Karsch. Berlin. Entom. Zeitschrift. Bd. XXXIII. 1889. pg. 347.

a₁) Nodalsector stark wellig (Orthetrine Libelluliden).

d) Nodalsector am Ende ungewöhnlich stark gebogen, wie bei der indischen Gattung *Lyriothemis*. Körper kurz, plump und dick. Höchstens anfangs 4 Zellen im Discoidalraum, dann 3 Zellenreihen. 16—21 Antenodalqueradern im Vorderflügel. Das Innendreieck im Hinterflügel fehlt, im Medianraum nur 1—3 Queradern. Membranula breit und lang. Seitenrand des 8. Segmentes beim ♀ ohne jede Erweiterung

=30. *Hadrothemis* Karsch. Entomolog. Nachrichten. XVII. 1861. pg. 75—77.

d₁) Nodalsector am Ende normal (mässig) gebogen. Achtes Abdominalsegment des ♀ am Seitenrande lappig erweitert.

e) Membranula lang, dreieckig (über ein Drittel des Analsaumes einnehmend). 3 Reihen Discoidalzellen. Innendreiecke im Hinterflügel fehlen. Körper ziemlich kräftig, Abdomen kürzer als die Hinterflügel. 18—20 Antenodalqueradern im Vorderflügel

=31. *Nymphetria* Karsch. Berliner Entomolog. Zeitschr. Bd. XXXIX. 1894. Heft 1. pg. 14.

e1) Membranula klein und kurz gerundet (3 Discoidalzellen). Innendreieck im Hinterflügel vorhanden. Körper dünn und schlank. 20—22 Antenodalqueradern im Vorderflügel

=32. *Archiclops* Karsch. Entomol. Nachr. XVII. pg. 78.

c1) Ocellenwulst von oben gesehen eingedrückt, sodass der Vorderrand bifid ist. (Nodalsector am Ende normal gebogen. VIII. Segment des ♀ am Seitenrande lappig erweitert.)

f) Ocellenwulst von oben gesehen mit 3 Eindrücken, sodass der Vorderrand 4 vorgezogene Ecken zeigt, 2 grössere in der Mitte und je eine kleinere seitlich, welche letztere beide die seitlichen Ocellen tragen. 19 und mehr Antenodalqueradern im Vorderflügel, 4 Reihen Discoidalzellen

=33. *Thermorthemis* Kirby. Transact. zoolog. Society of London. XII. 1889. pg. 261, 289.

f1) Ocellenwulst einfach bifid, d. h. nur vorn in der Mitte einmal eingedrückt, die Seiten etwas eckig vorgezogen. Nodalsector am Ende normal gebogen. 13 Antenodalqueradern im Vorderflügel, höchstens 3 Reihen Discoidalzellen

=34. *Orthetrum* Newman. Entomol. Magazine. 1833. pg. 511.

(*Misthotus* Kirby. Annals and magazine of Natural History. Ser. 7. Vol. XV. Febr. 1905.

2. Unterordnung. Cardinalzelle (Discoidaldreieck mit sehr deutlich gebrochener Vorderseite, sodass das

Discoidaldreieck mindestens deutlich unregelmässig vierseitig wird (Nannophye Libelluliden*).

Letzte Antenodalquerader verlängert

— 35. *Neophlebia*. De Selys-Longchamps.
Recherches sur la faune de Madagasc. par
Fr. Pollen et Van Dam 1867. Insectes pg. 18.

II. Die Verbreitung der afrikanisch-madagassischen Libellulidengattungen.

Über die Verbreitung der aufgezählten 35 Libellulidengattungen in Afrika lässt sich bis jetzt nur so viel sagen, das wohl die meisten Genera über das ganze tropische Afrika verbreitet vorkommen oder noch in diesem Sinne ihre Verbreitung festgestellt werden wird. 15 Gattungen gehören gemeinsam der afrikanisch-indischen Fauna an. Von diesen sind 3 Gattungen tropische Kosmopoliten und auch nach Amerika verbreitet. Europäisch, afrikanisch und zugleich indisch sind 5 Gattungen. Europa hat also keine einzige Libellulidengattung mit Afrika ausschliesslich gemeinsam. Rein afrikanisch sind nun 20 Gattungen bekannt, von diesen fliegen 5 auch auf Madagaskar, eine einzige ist allein von Sansibar beschrieben, ihr Vorkommen an der ostafrikanischen Küste darf aber als ziemlich sicher angenommen werden, wie überhaupt das Alter der Odonaten und ihre grosse Flugkraft eine lokale Verbreitung zur Seltenheit machen.

III. Bemerkungen zu einzelnen Libellulidengattungen.

Bei der Aufstellung neuer Libellengattungen spielt in der Regel in den Beschreibungen der Ursprung des Sector trianguli superior eine grosse Rolle. Dieser Sector kann gemeinsam mit dem Sector trianguli inferior aus einem Punkte, nämlich der Hinterecke des Dreiecks

*) Die Nannophyae dürften wohl die ältesten noch lebenden Libellulidenformen sein, ihnen gleich oder nahe stehend die Regulares mit nicht verlängerter Antenodalquerader im Vorderflügel, sodann die Regulares mit verlängerter Querader.

entspringen, oder aber auch von letzterem Sector abgerückt an der Aussenseite des Dreiecks, und zwar von kaum merklichem Abstände an bis zur halben Länge der äussern Dreieckseite. Die Natur lässt sich hierbei in kein dem Systematiker erwünschtes Schema pressen und wir finden bei demselben Genus, ja bei Rassen und Individuen derselben Art, vereinigte Sectors trianguli neben getrennten, z. B. bei *Crocothemis*. Dieses Merkmal ist demnach in Zukunft nur mit grosser Vorsicht bei Aufstellung neuer Gattungen zu verwenden, mindestens nicht als ausschlaggebendes Moment. Eine ähnliche Rolle spielt die Zahl der Queradern in den Diskoidaldreiecken (Kardinalzellen). Wenn wir auch von Gattungen wie z. B. *Neurothemis* absehen, welche bekanntlich in Variabilität des Kleingeäders abundiren, so gibt es dennoch genug Gattungen mit mehr fixirtem Kleingeäder, bei welchem der Wert der Dreieckqueradern als ausschlaggebendes Characterium sich mehr als fraglich erweist. So werden z. B. der Gattung *Trithemis* von den meisten Autoren ungeaderte Dreiecke im Hinterflügel zugeschrieben. Es besitzt aber eine zweifellos sonst typische *Trithemis*, *ardens* Gerstäcker, soweit an einer grossen Reihe von Exemplaren verschiedenster Herkunft ersichtlich, wie es scheint konstant im Dreieck der Hinterflügel eine Querader, oder wenigstens in der Regel.

12. *Termitophorba* nov. gen.

Die Type dieser Gattung, *T. rufina* n. sp. aus dem Somalilande, ein gedrungenes, rotes *Crocothemis*-artig gebautes Tier mit ähnlich wie bei *Trithemis ardens* breit rotgelb gefärbter Flügelbasis, wird in den Libellen der Expedition Carlo von Erlanger durch Abessinien und Somaliland ausführlich beschrieben und abgebildet werden, wie auch die nachfolgende Type.

17. *Philonomon* nov. gen.

Type der Gattung ist *Philonomon Erlangeri* n. sp.; eine Libelle mit hyalinem Geäder und von einer ungewöhn-

lichen Färbung des Körpers. Das Abdomen, schwarz und weissgelb gefleckt, ist an der Basis prächtig hell karminrot. Näheres in den Resultaten der Expedition Carlo von Erlanger durch Abessinien und Somaliland.

18. *Zygonyx* Selys-Grünberg.

Auch bei den Species dieser Gattung spielt ein innerhalb gewisser Grenzen variables Merkmal eine Rolle, nämlich die Länge des Klauenzahnes, die hier eine aussergewöhnliche ist, so dass der Zahn an Länge und Stärke mehr minder dem Klauenende gleichkommt und auch ungefähr im Niveau der Klauenspitze endet. Der hierfür gebrauchte Ausdruck „Klauen gespalten“ wurde in vorstehendem absichtlich vermieden, weil er eine andere Entstehungsweise des langen Klauenzahnes als durch einfache Verstärkung und Verlängerung des kleinen normalen Zahnes der Klauen der meisten übrigen Libellulidengattungen suggeriert. Bedenkt man noch die Variabilität der Queraderzahl im Dreieck, so dürfte der Streit der Autoren um die Gattungen *Pseudomacromia*, *Schizonyx*, *Schizothemis* fast gegenstandslos sein, sodass diese Gattungen, wie Grünberg mit Recht bemerkt, höchstens den Rang von Untergattungen von *Zygonyx* De Selys einnehmen können.

20. *Crocothemis* Brauer, *Bebilecia* Kirby und *Apeleutherus* Kirby.

Die Variabilität des Ursprungs des Sector superior trianguli bei *Crocothemis* wurde bereits eingangs dieser Bemerkungen erwähnt. Auch hier ist die Variabilität der Queraderzahl im Dreieck eine recht grosse. So hat bei einer im Nachfolgenden näher gekennzeichneten neuen Art oder Rasse der *Bebilecia* *adolescens* Kirby von West-Afrika das Dreieck bei 2 Männchen und Weibchen im Vorderflügel eine, im Hinterflügel keine Querader, ein Weibchen jedoch im Vorderflügel links keine, rechts eine Querader, dagegen in beiden Hinterflügeln je eine Querader. Nach der Form des Sector superior trianguli und den übrigen Charakteren hat Prof. Karsch *Bebilecia* Kirby

bereits als synonym mit *Crocothemis* Brauer erklärt. In derselben Arbeit (l. c.) beschreibt aber Kirby eine weitere Gattung *Apeleutherus*, deren Trennung von *Crocothemis* mir nicht gelingt. Kirby sagt über die Gattung nur, dass sie mit *Crocothemis* und *Hadrothemis* verwandt sei. Die Schwierigkeit, die bei der Zunahme der Zahl der beschriebenen Libellulidengattungen in Zukunft immer grösser wird, liegt aber darin, zu finden, wie sich die neue Gattung überhaupt von den verwandten unterscheidet, soll die Beschreibung einen modernen Charakter haben. *Apeleutherus* *Strachani* Kirby lässt durch sein buntfarbiges Abdomen vermuten, dass wenigstens ein aberrantes Glied der *Crocothemis*-Verwandten vorliege und lassen sich vielleicht noch schärfere Trennungsmerkmale finden.

21. *Trithemis* Brauer.

Den Unterschied der Gattungen *Crocothemis* und *Trithemis* ist ein sehr geringer. Er liegt wohl in der plumperen Gestalt von *Crocothemis* neben dem von Karsch aufgefundenen Merkmal, dem Verlauf des *Sector trianguli superior*. An Übergängen von der einen Gattung zu der andern wird es nicht fehlen. Auch die Form des Abdomens ist sehr variabel. Kirby hat neuerdings den Versuch gemacht, die Gattung *Orthetrum* zu spalten, hauptsächlich mit Hilfe der Form des Abdomens. Hier wäre ebenfalls ein reiches Feld für derartige Bestrebungen ob aber mit Erfolg, erscheint mir zweifelhaft. Die von Kirby aufgestellte Gattung *Stoechia* (Type *Stoechia Distanti* Kirby) ist identisch mit *Trithemis*, und nur durch die blaue Bestäubung des ♂ im Alter merkwürdig. Sie bildet durch Afrika mehrere Rassen und Unterarten und besitzt ausserdem einen sehr langen Hamulus, der aber sonst ganz *Trithemis*-artig gestaltet ist. Bei einer Rasse ist das sonst gleichmässig verjüngte Abdomen sogar an der Basis etwas aufgeblasen und dann eingezogen (*T. (St.) Erlangeri* n. sp.) Das ♀ ist aber ebenso verschiedenfarbig wie bei den rotgeaderten Species, nämlich gelb und

schwarz, auch im Alter. Das Kgl. Ungarische Nationalmuseum erhielt eine *Trithemis*, bei welcher beim ♂ das in der Jugend wie *Stoechia* gelb und schwarz gefleckte Abdomen im Alter ebenfalls blau bereift wird. Das Abdomen dieser Art ist aber ebenso zierlich wie etwa bei *Trithemis sanguinolenta* Burm. (*ferrugaria* Calvert), während die *Stoechien* Kirby zumteil plumpere, kräftige Tiere von, besonders im weiblichen Geschlecht, mehr *Orthetrum*-artigem Aussehen sind, sodass wahrscheinlich *Orthetrum Lorti* Kirby (*Proced. Zool. Soc. of. London* 1896 N. XXXIV.) eine *Stoechia* Kirby ist, wenn nicht eine *Apatelia* Karsch. Meine Gattung *Philonomon* steht gewiss auch der Gattung *Trithemis* sehr nahe, ebenso der Gattung *Sympetrum* und halte ich sie für eine sehr altertümliche Gattung. Sie zeigt einerseits habituelle Beziehungen zu *Trithemis hova* von Madagaskar, anderseits zu *Trithemis subpruinosa* Kirby von Ceylon, ohne dass es möglich wäre, diese 3 Formen, wie ich gern getan hätte, unter einen Hut zu bringen.

Der Verlauf des Nodalsectors ist bei den vielen *Trithemis*-arten meiner Sammlung ziemlich übereinstimmend indem er auf der Mitte sehr schwach aber deutlich nach vorn convex erscheint. Eine einzige Ausnahme macht die merkwürdige *Trithemis subpruinosa* Kirby (*dryas* Selys in lit), indem bei ihr der Nodalsector auf der Mitte auch keine Spur convex nach vorn ist, sondern gerade verläuft bis fast zum Ende. Bei dieser Art sind die Innendreiecke im Vorderflügel ungewöhnlich gross, auch ist die Vorderseite im Hauptdreieck kürzer als bei den übrigen *Trithemis*. Im übrigen lässt sich die Art nicht gut von *Trithemis* trennen, stimmt insbesondere auch im Bau des Genitalanhanges von Segment II beim ♂ vollkommen mit den ächten *Trithemis* überein.

25. *Allorhizucha* Karsch.

Diese Gattung konnte ich nur nach einer Anzahl Exemplaren studieren, welche ich aus dem Dorfe Mbundjo am mittleren Kongo (Kamerun) erhielt und zu All. Preussi

Karsch rechne. Die Gattung ist durch das sehr einfache Geäder sehr merkwürdig und weicht besonders durch den Verlauf der Gabeläste des Sector trianguli inferior im Hinterflügel von allen mir bekannten afrikanischen Libelluliden ab. Sie hat auch den Subcostalraum beim Nodus deutlich breiter als der Costalraum, während er z. B. bei *Neodythemis Hildebrandti* deutlich schmaler oder gar nur halb so breit als der Costalraum ist. Im Brückenraum vorn und hinten 4 Queradern (bei *Neodythemis* 3). Der Genitalanhang von *Allorh. Preussi* ist sehr merkwürdig. Er wird vom 2. Segment fast kelchartig umfasst. Ein Vorderlappen ist nicht entwickelt, der Hinterlappen nur mässig, so dass er von den sehr grossen, von der Seite gesehenen kahnförmigen Hamuli überragt wird, bei welchen letzteren die Basis der schmalere Teil ist. Der hintere Teil des Hamulus besitzt einen nach vorn abschüssigen, wulstigen Aufsatz. Von diesem wandartigen Gebilde springen nun die eigentlichen Greiforgane lamellenartig nach innen vor, mit einem langen, senkrecht nach unten abstehenden schmalen Hörnchen am hinteren Ende und einer noch längern, geraden, dornartigen, wagrecht nach vorn und innen gerichteten Spitze. Der Bau der Hamuli weist auf eine gewisse Verwandtschaft mit *Neodythemis* Karsch hin.

26. *Neodythemis* Karsch (*Oreoxenia* Foerster 1899).

Im Jahre 1899 gab Karsch die Resultate seines Studiums der Libelluliden mit vierseitiger Kardinalzelle (*Nannophye Libelluliden* Karsch) bekannt. (*Entomol.-Nachrichten* 1899 pg. 249). In dieser Arbeit stellte Karsch eine Unterabteilung der *Nannophyae secretae* auf, wozu er verschiedene Libelluliden von meist geringer Grösse zog, welche die Vorderseite des Dreiecks im Vorderflügel sehr ungleich und undeutlich gebrochen zeigten. Zu diesen *Nannophyae secretae* zählte Karsch eine von ihm in der gleichen Arbeit aufgestellte Libellulidengattung, *Neodythemis* Karsch von Madagaskar (Type *Neodythemis Hildebrandti*). Im Jahre

1899 (Entomol.-Nachr. pg. 186—191) beschrieb ich eine der *Neodythemis Hildebrandti* sehr ähnliche Libelle als Typus einer neuen Gattung *Oreoxenia*, ebenfalls von Madagaskar. Meine Gattung *Oreoxenia* konnte nach den damaligen Anschauungen nicht mit *Neodythemis* vereinigt werden, da die einzige Type *Oreox. ouvirandrae*, vollkommen normale Dreiecke mit auch nicht im geringsten gebrochener Vorderseite besitzt. Indessen hat sich herausgestellt, dass die Gruppe der *Nannophyae secretae* unhaltbar ist, indem sich bei den meisten Libelluliden einzelne Individuen finden, bei welchen der *Sector brevis* die eine Vorderecke etwas abstutzt, oder die sonst eine Dreiecksseite sehr nahe dem einen Grenzpunkt gebrochen zeigen. (Vergleiche hierüber Karsch in „Kükenthal, Ergebnisse einer zool. Forschungsreise in den Molukken und Borneo“. II. Teil, Bd. III., pg. 218). So bin ich auch ziemlich überzeugt, dass meine *Oreoxenia ouvirandrae* identisch mit *Neodythemis Hildebrandti* Karsch ist. Seitdem erhielt ich aus den Bergen von Westusambara 3 Stück einer Rasse der *Neodythemis Hildebrandti*. Während aber letztere Art auch im Vorderflügel breit getrennte *Sectores trianguli* zeigt, so sind bei der Usambara-Species die *Sectores trianguli* im Hinterflügel kaum merklich getrennt, entspringen im Vorderflügel sogar aus einem Punkt. Demnach muss das Tier zur Gattung *Micromacromia* Karsch gestellt werden, wodurch gezeigt ist, auf welchen schwachen Füßen die Gattung *Micromacromia* steht. (Über den generischen Wert der Ursprungsverhältnisse der *Sectores arculi* habe ich mich bereits eingangs dieser Bemerkungen ausgesprochen).

34. *Orthetrum* New.

W. F. Kirby beschreibt in einer Note über Odonaten von Maschonaland (l. c.) ein neues Genus *Misthotus* mit zwei Arten, *M. Marschalli* n. sp. und *M. ambiguus* n. sp. Zu letzterer, von Transvaal stammender Art bemerkt er: „Vielleicht verwandt mit *Orthetrum farinosum* Foerster“. Was nun das Geäder anlangt, so stimmt Kirbys Diagnose

z. B. mit *Orthetrum caerulescens* Fabr. (*Libella* Brauer) Auch bei dieser Art sind die *Sectors trianguli* im Hinterflügel (sehr wenig) getrennt. Kirby sagt weiter: „Unterscheidet sich von *Orthetrum* New. hauptsächlich durch das unaufgeblasene und nicht eingeschnürte Abdomen“. Es würden also *Misthotus*-Arten sein alle europäischen Arten von *Orthetrum* und deren Verwandte in Asien und Afrika, ferner alle Arten der westlichen indischen Fauna mit rotem Abdomen. Die östlichen Rassen der letzteren würden, weil aufgeblasen und eingeschnürt, von ihren nächsten Verwandten hinweg zu den blauen *contractum*-artigen Formen gestellt werden müssen, um die alte Gattung *Orthetrum* New. zu bilden. Ich kenne die Type Newmans nicht, Kirby gibt *O. caerulescens* als solche an, es ist auch anzunehmen, dass Newman die europäischen Arten allein seiner Gattung zu Grunde legte, sodass also *Misthotus* Synonym von *Orthetrum* New. (*Libella* Brauer) wäre. Mein *Orthetrum farinosum* scheint weder identisch mit *Misthotus Marshalli* noch *ambiguus* zu sein, ist auch viel grösser als letztere Species (long. corpor. 45 mm explanat. alarum 73 mm). Sie hat mit *Orthetrum bruneum* Fonscol. den kleinen Vorderlappen des Genitalanhanges von Segment II gemeinsam. Was ihr eigen ist, das ist der verhältnismässig kleinere, halbkreisförmige Prothoraxmittellappen, der aber behaart ist. Bei den europäischen Arten ist der Prothoraxmittellappen etwas grösser, unten etwas an den Seiten eingeschnürt, sein Oberrand mehr weniger bogig, bis fast gerade. *O. farinosum* erinnert durch den kleineren Prothoraxhinterlappen fast an *Deielia*, aber diese Gattung hat den Ocellenwulst convex und vorn gerade, nicht bifid. Die Form des Prothoraxmittellappen schwankt etwas, sie kann daher zu einer Bestimmungstabelle der *Orthetrum*-arten neben der Länge des vordern Genitallappens, der Form und Farbe des Abdomens mit Vorteil verwendet werden.

IV. Beschreibung neuer Arten und Bemerkungen zu bereits bekannten Gattungen und Formen.

Zygonyx komatina n. sp.

Länge des Körpers 49 mm, des Abdomens 37 mm, der obern Appendices anales 3 mm, eines Hinterflügels 38 mm, dessen grösste Breite im Niveau der 1. Antenodalquerader 12 mm, Flügelspannung 82 mm, Länge des Pterostigma 3 mm. Gesicht ganz gelb, die Enden der Mundteile bräunlich, ebenso eine Punktgrube auf der Mitte der Oberlippe. Stirn hell metallblau, nicht violett, quengerunzelt, Ocellenwulst bräunlichgelb mit blauem Schimmer, die gelben Teile fein und kurz, weisslich gewimpert, das blaue Feld mit schwarzer Behaarung. Hinterhaupt gelb mit je einer schwarzen Strieme am obern Augenrand. Prothorax und Thorax sehr fein weisslich blau (aschblau) bereift. Thorax vorn mit weisslichen Wimpern besetzt, die Seiten metallblau mit gelben Striemen, von welchen je eine auf den beiden hintern Nähten zu erkennen sind, eine dritte an der Hinterkante der Thoraxseiten. Abdomen beim reifen ♂ oben breit schwarz oder schwarzbraun, oben die Längskante und eine feine basale Querlinie auf Segment III—V gelb, ebenso eine Längsline am Seitenrand der Segmente IV—VIII. Die Seiten von Segment I und II fast ganz gelb, Segment II vor dem Kiel weisswollig behaart, dort etwas bläulich bereift. Genitalanhang von Segment II wenig hervortretend, von der Seite gesehen durch Vorderlappen, Hamulus und Genitallappen fast gleichhoch dreizackig. Die beiden vordern Beinpaare bis zu den Tibien hell gelbbraun, der Rest schwarz. Beim hintern Beinpaare die Hüften und die Innenseite der Schenkel bis fast zum Ende gelb, das übrige schwarz. Klauenzahn der Vorderbeine kräftiger aber höchstens so lang als das Klauenende, am mittleren Beinpaare kräftiger, auch deutlich länger als das Klauenende am hintern Beinpaare gleichfalls dicker und kaum kürzer. Appendices anales schwarz, die obern am Ende schräg von unten nach oben abgestutzt, an der Unterecke mit

einem Zähnchen, bis zu welchem der untere Anhang reicht. Pterostigma hellgelbbraun, längs der vordern Grenzader ein schwarzer Schatten. Geäder schwarz. Vorn 11, hinten 8 Antenodalqueradern, vorn 7, hinten 9 Postnodalqueradern. Dreieck im Vorderflügel durch eine Querader geteilt, mit 3 Reihen Discoidalzellen. Nebendreieck dreizellig. In allen 4 Flügeln zwischen Sector subnodalis und dem Hilfssector dahinter nur eine Zellreihe. Arculus fast in der Mitte zwischen der 1 und 2 Antenodalquerader, etwas näher der zweiten. Alle Hypertrigonalräume frei, in allen 4 Flügeln nur die eine Submedianquerader. Membranula weisslich, am Innenrande grau. Kirby gibt seine *Pseudomacromia torrida* auch von Natal an, vielleicht gehört diese Form zu *komatina*. Sie ist wesentlich kleiner als die westafrikanische Type der *torrida*, ferner durch hellere Färbung, hellblaue statt violette Stirn und einfacheres Geäder verschieden. Wenigstens nach der von Kirby der Beschreibung der *torrida* beigegebenen Abbildung zu schliessen, ist bei letzterer Art der Seitenrand des Abdomens bis zum Ende gerade wie bei *Zygonyx luctifera* Selys, während er bei *hova* Ramb schon, noch stärker bei *komatina*, eingebuchtet ist, sodass dadurch das an der Basis schwach aufgeblasene Abdomen bei Segment IV etwas verengt wird, dann gegen das Ende wieder fast um $\frac{1}{3}$ breiter ist. Segment II oben quer über 3 mm breit, Segment IV 2 mm, VII und VIII wieder stark 3 mm, IX und X wieder etwas schmaler. *Zygonyx Donaldsoni* Calvert ist kleiner und hat eine violette Stirn, *hova* ein schwarzes Pterostigma, eine tiefblaue, nicht hellblaue Stirn und ist am Thorax tiefblau, nicht weissblau bereift. Die kleinere noch mehr melanistische *luctifera* hat ebenfalls eine schwarzblaue Stirn, ausserdem die oben angegebene Form des Abdomens.

Vorkommen: Komatipoort am Komatifluss in Transvaal.

Zwei adulte ♂♂, von Herrn Karl Hartmann am 3. Januar 1898 erbeutet. Typen in meiner Sammlung.

Crocothemis ikutana n. sp.

♂ Körperlänge 32 mm, Länge des Abdomens 24 mm, der oberen Appendices anales $1\frac{1}{2}$ mm, Flügelspannung 60–63 mm, Länge eines Hinterflügels 30 mm, dessen grösste Breite im Niveau der Aussenseite des Dreiecks gemessen 9 mm, Länge des Pterostigma kaum 4 mm. Körper olivengrün und rot, Gesicht okergelb, Nasus, Stirn, Fühler und Oberseite des Ocellenwulstes dunkler oliv. Letzterer von oben gesehen vorn mit schwach ausgebuchteter Kante. Der mit kleinem Hinterrand versehene Prothorax sowie der Thorax bräunlich olivengrün, die Unterseite und die Seiten heller. Je ein medianer Interalarwulst der Oberseite hellokergelb. Abdomen schlank, ziemlich dünn im Vergleich zu *Croc. erythraea*. Basis keine Spur aufgeblasen, sogar von oben gesehen weniger breit als bei Segment IV und V, erst Segment VI so breit als I–III, die Endsegmente immer schmaler, das X. Segment immer noch halb so breit als das V. Die Basis des Abdomens olivengrün bis etwa zu Segment IV, auf III schon etwas rötlich, die übrigen Segmente (im hohen Alter vielleicht alle) ziegelrot oder hellblutrot. Genitalanhang des II. Segmentes gelbrot, der Vorderlappen sehr nieder halbringförmig. Hamulus lang, breit lanzettlich, im letzten Viertel in eine schmale Spitze ausgezogen, nach hinten anliegend. Nach innen ist er gegabelt, der innere Gabelast dünn fadenförmig, fast wagrecht, etwas nach innen convex gebogen, von unten nach oben gesehen fast ein Fünftel so breit als der äussere Gabelast, seine äusserste Spitze schwarz. Hinterlappen schmal lanzettlich, am Ende gerundet, etwas länger als der anliegende Hamulus. Beine okergelb, die Bedornung dunkler, Flügel ganz hyalin ohne eine Spur eines gelben Basalfleckens. Geäder schwarzbraun, die Costalader am Vorderrand bis zum Pterostigma hell okergelb, ebenso die Queradern im Subcostalraum teilweise bis zur Postcostalader, die Subcostalqueradern bis zur ebenfalls noch hellen Verlängerung des Nodus. Pterostigma kaum 4 mm lang, ziegelrot. Membranula 3 Analzellen lang, sehr schmal dreieckig, blassrötlichgelb.

Vorn 11—12 Antenodalqueradern, hinten 9, in beiden Flügeln 9—10 Postnodalqueradern. Dreieck im Vorderflügel durch eine Querader geteilt, in der basalen Hälfte des Discoidalraumes mit 3 Reihen Zellen. Arculus zwischen der 1. und 2. Querader, etwas näher der zweiten, im Hinterflügel fast bei der zweiten. Vorn und hinten 1 Submedianquerader. Nebendreieck dreizellig. Ursprung des obern Sector trianguli von dem des untern um eine halbe Zellbreite nach aussen abgerückt. Raum zwischen dem Hilfssector und dem Subnodalis gegen das Ende zu sehr stark verengt, bis zu einem Drittel der früheren Breite, da der Hilfssector stark nach hinten convex ist, mit 2 Zellreihen in der Mitte. Dreiecke im Hinterflügel ungeadert, bei einem Exemplar in einem Flügel die Aussenseite des Dreiecks durch eine kurze Querader abgestutzt. Das Zellwerk nahe dem Aussenrande des Flügels ausserordentlich vermehrt, die Zellen sehr klein, so z. B. zwischen Sector nodalis und subnodalis im Vorderflügel 25 Randzellen.

♂ juv. Beim jungen Männchen ist das Rot durch hellokergelb ersetzt, alle Farben blasser, Pterostigma eher hellokergelb als rot.

♀ Körperlänge 31 mm, Länge des Abdomens 23—24 mm, Flügelspannung 62 mm. Länge der schmal-lanzettlichen Appendices anales 1 mm. Die breit zungenförmige Legscheide überragt das IX. Segment und reicht bis zur Hälfte des X. Segments. Färbung olivengrün wie beim Männchen, das Rot wie beim jungen ♂ durch hellokergelb ersetzt, ebenso das Pterostigma mehr okergelb.

Bei einem Stück sind beide Dreiecke im Vorderflügel durch eine Querader geteilt, die hintern Dreiecke ungeadert, bei einem zweiten Exemplar fehlt die Querader im Dreieck des linken Vorderflügels, dagegen sind die beiden hintern Dreiecke fast hälftig geteilt. Sonst wie das Männchen. 2 ♂, 2 ♀ in meiner Sammlung.

Vorkommen: Boa, Ikuta, am Fusse der Luitpold-Kette, Britisch-Ostafrika.

Cr. ikutana ist wohl nur eine östliche Rasse der *Beblecia adolescens* Kirby. *Cr. adolescens* Kirby ist grösser, das Geäder dichter (so beginnt der Discoidalraum mit 4 statt mit 3 Zellreihen u. a. m.). Das Pterostigma ist 5 mm lang statt 4. Die Altersfärbung ist noch unbekannt.

Crocothemis erythraea pygmaea n. sbsp.

Körperlänge 30—38 mm. Länge des Abdomens 23—25 mm, der obern Appendices anales $1\frac{1}{2}$ mm, Länge eines Hinterflügels 27—30 mm. Flügelspannung 55 mm. Geäder und Färbung wie bei *erythraea* Brullé, jedoch das Abdomen verhältnismässig schlanker, mehr rund und nach hinten stärker verjüngt. Genitallappen schmal lanzettlich, gleich breit bis zum Ende und dort gerundet (bei *erythraea* ist er an der Basis eingeschnürt, kopfförmig, mit fast kreisförmiger Seitenfläche, am Ende etwas zugespitzt). Am leichtesten ist die Form am Pterostigma zu erkennen. Dieses ist nämlich meist nur $2\frac{1}{2}$ —3 mm lang, während es bei der typischen *erythraea* 4 mm lang wird, entsprechend der bedeutenderen Grösse. Ferner ist seine Farbe nicht hell ockergelb wie bei *erythraea*, sondern braunrot bis hell karminrot beim reifen ♂ ♀. Gelber Basalfleck wie bei *erythraea*. Dass hier eine geographische Rasse vorliegt, beweist das Vorkommen. Die Art liegt typisch vor von Komatipoort im Transvaal, von Herrn Karl Hartmann in einigen Stücken am 15. April 1897 gesammelt, ferner in einer grösseren Anzahl Exemplaren von Nguelo im Bergland von W. Usambara. Die typische *erythraea* findet sich in ganz Nordafrika, auf den Kanaren, scheint aber den Küsten entlang auch weit nach Süden verbreitet zu sein, wie ein aus Sikumba (Maputo) in Portugiesisch-Ostafrika stammendes altes Männchen beweist.

Trithemis Stuhlmanni Gerstäcker.

Bei sonst typischen Stücken von Nguelo, Bergland von Ost-Usambara, sind die Vorderflügel an der Basis keine Spur gelbrot gefleckt, der rote Fleck an der Basis

der hintern Flügelpaare reicht nicht ganz bis zur Innenseite des Dreiecks.

Trithemis pluvialis n. sp.

♂ ad. Körperlänge 35 mm, Länge des Abdomens 24 mm, Explanatio alar. 58 mm, Länge eines Hinterflügels 27 mm, seine grösste Breite, im Niveau der 3. Antenodalquerader gemessen, 10 mm. Vorn 12 Antenodalqueradern, 8 Postnodalqueradern, hinten 9 bzw. 8. Dreieck im Vorderflügel mit einer Querader, hinten ungeadert. Zwischen dem Sector subnodalis und dem Hilfssector dahinter wenigstens in der Mitte zwei Zellreihen. Sectors trianguli im Hinterflügel aus einem Punkt. Die Flügel hyalin, das Geäder ungefähr bis zum Nodus deutlich hellrot, nach dem Nodus deutlich schwarz oder schwarzbraun. Vorderflügel fast ganz wasserhell, nur die Basis bis zur 1. Antenodalquerader schwach rotgelb, stärker im Subcostalraum sowie im Submedianraum und dem dahinter liegenden Teil der Flügelbasis. Im Hinterflügel geht die rostgelbe Färbung bis zur zweiten Antenodalquerader, zur Innenseite des Dreiecks und läuft dann schwach convex nach aussen begrenzt bis zum Hinterrand. Pterostigma 3 mm lang, schwarz, längs dem Hinterrand kaum merklich braungelb gesäumt, Gesicht ganz gelb oder gelbgrün, nicht metallisch. Ocellenwulst dunkler, unmetallisch. Oberlippe lebhaft gelb, am mittleren Drittel des Endrandes ein biconvex begrenzter schwarzer Fleck. Unterlippe orangerot, das mittlere Drittel mit schwarzer Längstrieme. Prothorax und Thorax grüngelb, rötlich angeflogen, eine feine schwarze Strieme über das Spiraculum, eine zweite, undeutliche, nach oben gegabelte über die letzte Seitennaht. Nähte der Thoraxunterseite schwarz liniert. Abdomen blutrot, die Seiten heller, orange, der Rückenkiel und besonders die Seitenkanten der hinteren Segmente fein schwarz liniert. Appendices anales rotgelb, die Enden dunkler. Am Genitalanhang des II. Segmentes der Vorderlappen sehr kurz, schwarz, breit abgestumpft, Hamulus grösser, einfach, aus breit lanzettlicher

Basis nach oben kaum verjüngt, am Ende gerundet und die Spitze nach hinten übergeneigt, unten mit einem kleinen, sehr kurzen Enddorn versehen, rotgelb, der körnige Vorderrand glänzend schwarz. Hinterlappen sehr schmal lanzettlich, fast senkrecht abstehend, ungefähr so gross als der Hamulus, rot. Beine schwarz, mit Ausnahme der Hüften und der Innenseite der Vorderschenkel, welche eine gelbe Färbung zeigen. — Die Art hat die Flügel-färbung der *Tr. aurora* und *Stuhlmanni*, bei *Stuhlmanni* ist aber die Stirn stark metallisch rot, ferner ist bei allen ähnlichen Arten das Geäder fast ganz rot, auch nach dem Nodus.

Vorkommen: Nguelo, Bergland von West-Usambara.

Ein einziges ♂ in meiner Sammlung.

Neodythemis miraculosa n. sp.

♂ Körperlänge 33 mm, Flügelspannung 57 mm, Länge eines Hinterflügels 28 mm, des Abdomens 22 mm. Vorn 13—14 Antenodalqueradern, hinten 11—12, vorn und hinten 10 Postnodales. Flügel hyalin mit schwarzem Geäder, im Hinterflügel der Subcostalraum eine Zelle weit, der Submedianraum $\frac{3}{4}$ Zellängen weit dunkelbraun, gegen das Ende der Zelle allmählich heller. Der Form nach die Flügel bis zum Ende fast gleichbreit, mit breit gerundetem Ende. Grösste Breite des Hinterflügels im Niveau der Aussenseite des Dreiecks gemessen, $7\frac{1}{2}$ mm. Vorderflügel: Discoidaldreiecke ungefähr gleichseitig, bei einem Exemplar durch 1 Querader geteilt, bei einem andern ungeadert. Ersteres Exemplar hat auf der einen Seite ein ungeadertes Nebendreieck, während auf der andern Seite die hintere Spitze des Nebendreiecks durch eine Querader abgeschnitten ist. Bei dem Stück mit ungeadertem Dreieck sind merkwürdigerweise die beiden Nebendreiecke durch eine Querader fast median geteilt. 1 oder auch asymmetrisch 2 Hypertrigonalqueradern, 1 Submedianquerader. Der Arculus liegt bei der 3. Antenodalquerader oder nahe vor derselben. Sectors

arculi nicht sehr lang gestielt (etwa um die Hälfte der Länge einer Antenodalzelle); bei *N. Hildebrandti* Karsch um eine ganze Zelllänge). Sectors trianguli aus der Hinterecke des Dreiecks entspringend. Der vordere endet im Niveau des Nodus am Hinterrande, der hintere dem vordern ungefähr parallel. Hinter den beiden Sectors trianguli ist der Postcostalraum nur 1 Zelle breit mit Ausnahme von etwa 4 Zellen in der Mitte, welche geteilt sind. Subnodalsector gerade, Nodalsector ebenfalls noch ziemlich gerade, nicht deutlich wellig. Pterostigma $2\frac{1}{3}$ mm lang, $\frac{1}{2}$ mm breit, tiefschwarz. Hinterflügel: 11—12 Antenodalqueradern, 10—11 Postnodalqueradern, Dreiecke durch 1 Querader geteilt, 1 oder asymmetrisch 2 Hypertrigonalqueradern, Arculus zwischen der 2. und 3. Antenodalquerader, dicht bei letzterer entspringend, die Innenseite des Dreiecks in seiner Verlängerung. 3 Submedianqueradern, die äusserste schief, also ein Nebendreieck vorhanden. In der basalen Hälfte des Discoidalraumes wie im Vorderflügel 2 Reihen Zellen. Sectors trianguli gemeinsam aus der Hinterecke des Dreiecks oder kaum merklich getrennt, der obere kreisbogenförmig, im Niveau des Ursprungs des Mediansectors endend, der untere erst 4 Zellen weit dem vordern parallel, dann gegabelt, der äussere Gabelast auch weiterhin dem vordern Sector parallel, der innere vollkommen senkrecht auf den Hinterrand des Flügels zulaufend. Zwischen Sector brevis und vordern Dreiecksector 11—12 Randzellen, zwischen Subnodalsector und Mediansector ungefähr 21. Im Brückenraum wie im Vorderflügel 2 Queradern. Die Area auf der Innenseite des Sector trianguli inferior mit einer Zellreihe. Postcostalfeld vor dem Dreieck 4 Zellen breit. Der Hilfssector hinter dem Subnodalis parallel dem Subnodalis, die Zellreihe zwischen beiden Sektoren am Ende kaum verengt. Pterostigma $2\frac{1}{2}$ mm.

Körper schwarz und gelb, das Schwarze teilweise mit dunkelblauem Metallglanz. Der oben gewölbte, vorn ausgerundete, in 2 Spitzchen vorgezogene Ocellenwulst metallblau, ebenso Stirn und Nasus, erstere schwarzhaarig.

Übriges Gesicht hellgelb. Schwarz sind: Die ganze Oberlippe bis auf 2 basale Strichflecke, sowie 1 Stück des Seitenteiles der Basalkante des Rhinarium, von der Oberlippe auslaufend, ebenso die Endhälfte der Mundteile. Unterlippe orangegelb, ein von der Basis ausgehender ringsum von Gelb umrahmter fünfseitiger Fleck schwarz. Hinterhaupt schwarzblau, oben mit 2 gelben Punkten, die Schläfen mit 3 gelben Flecken, von welchen der oberste den Augenrand nicht berührt. Thorax vorn samtschwarz, ein Querstrich an der Basis und ein Längsstrich über den Mittelkiel gelb, die schwarze Färbung jederseits von vorn über die gelben Thoraxseiten netzaderig verlaufend, etwas blaumetallisch, sodass dadurch etwa 12 dreieckige oder ovale gelbe Flecken abgegrenzt werden. Von diesen ist der vorderste, oberste kommaförmig, der darunter gelegene mittlere punktförmig-oval, der basale doppelt so gross als der mittlere, oval. Antealarsinus jederseits in eine starke ohrförmige Spitze ausgezogen, schwarz. Interalarflecken gelb. Unterseite des Thorax gelb, netzig schwarz gebändert. Hinterschildchen des Thorax gelb. Prothoraxmittellappen gross, breit herzförmig, etwa 3mal so breit als hoch, schwarz, mit langen braunschwarzen Wimperhaaren besetzt. Der Prothorax selbst schwarz, der aufgebogene Vorderrand gelb, ebenso eine helmförmige Zeichnung auf dem Mittelstück. Abdomen an der Basis wenig breiter als bei Segment IV, nicht deutlich aufgeblasen, nach hinten dünn, auch am Ende kaum breiter, schwarz, gelb gefleckt. Gelb sind: Ein dreieckiger Fleck auf Segment I, ein ovaler Fleck auf Segment II, zwei dreieckige basale Flecken auf Segment III, die an ihrer inneren Basis fast angrenzen und so eine hufeisenförmige Binde bilden können, ferner 2 ovale gelbe Flecken nahe und hinter der Querbinde des III. Segmentes. Die gelbe Zeichnung reduziert auf Segment IV, auf V nur noch eine Spur, nach hinten ganz verschwindend. VII. Segment auf der Mitte mit 2 durch die Längsnaht fein schwarz geteilten gelben Punktflecken. Segment VIII—X und die Appendices anales ganz schwarz. Seiten von Segment I

breit gelb, von Segment II mit 2 ebensolchen Punkten, der untere doppelt so gross als der obere, Segment unten mit 2 gelben Längsstriemen, die auf der Mitte der übrigen Segmente teilweise schattenhaft angedeutet sind. Beine tiefschwarz, die Hüften gelb gefleckt, ebenso die Innenseite der Vorderschenkel gelb.

Genitalanhang des II. Segmentes nicht stark hervortretend, schwarz. Vorderlappen fehlt. Hamulus sehr breit und nieder, von der Seite gesehen ohrmuschelförmig, vorn und hinten etwas nach innen eingebogen und dort mit einem Häkchen versehen, die Innenseite eben, aber schräg abfallend, hellgelb. Sie ähneln derjenigen von *Allorhizucha Preussi* und von *N. Hildebrandti* in bezug auf ihre grosse Breite. Hinterlappen schwarz, lanzettlich, kaum höher als der Hamulus.

♀ ad. Körperlänge 34 mm. Explanatio alarum 60 mm. Länge des Abdomens 24 mm, eines Hinterflügels 30 mm. Pterostigma 3 mm lang. Abdomen an der Basis keine Spur aufgeblasen, nach hinten kaum verengt. Der Seitenrand des VIII. Segmentes etwas lappig erweitert. Flügel ganz hyalin. Vorn und hinten nur 1 Hypertrigonalquader, das Dreieck durch 1 Ader geteilt, ebenso das Nebendreieck im Vorderflügel. Die *Sectores trianguli* entspringen sowohl im Vorder- als auch im Hinterflügel getrennt, hinten mehr entfernt als vorn. Im Vorderflügel ist die Aussenecke des Dreiecks durch den *Sector brevis* abgeschnitten (*Nannophyae secretae* Karsch). Das ♀ dieser Art ist also eine typische *Neodythemis* Karsch, während das Männchen zur Gattung *Micromacromia* Karsch gehört. Von *Neodythemis* (*Micromacromia*) *camerunica* Karsch ist die Art sofort an der Färbung des Kopfes unterscheidbar, ebenso von *N. Hildebrandti* Karsch von Madagaskar. Die viel grössere habituell sehr ähnliche *Atoconeura leopardina* ist an dem längern gleichschenkligen *Discoidaldreieck* der Vorderflügel sofort erkennbar.

Vorkommen: Nguelo im Berglande von Ost-Usambara.

Typen: 2 ♂ ♂, 1 ♀ in coll. Foerster.

Atoconeura Karsch.

Herr Prof. Karsch kannte nur das ♀ seiner Gattung *Atoconeura*. Es folgt deshalb hier die ausführliche Beschreibung der männlichen Charaktere.

♂ ad. Statur zierlich, wie bei *Agrionoptera*, die Flügel aber an der Basis viel breiter. Kopf gross, breiter als der Thorax, die Augen in kurzer Naht verbunden, ohne Erweiterung am Schläfenrande. Oberlippe in der Mitte mit einer tiefen basalen Punktgrube, Stirn oben in der Mitte mit tiefer und breiter Längsfurche, die Stirnkante vorn gerade, die Stirneckten ohne Zahn, abgerundet, wie der Ocellenwulst, die Thoraxvorderseite und die äusserste Basis des Abdomens behaart. Endglied der Fühler etwa $\frac{1}{3}$ länger als das vorletzte Glied. Ocellenwulst vorn schwach eingedrückt, sein Vorderrand daher von oben gesehen seicht ausgerandet, schwach bifid. Mittellappen des Prothoraxhinterrandes aufrecht, gross, fast so hoch als breit, herzförmig, am Rande langgewimpert.

Abdomen schlank und dünn, an der Basis aufgeblasen, dann bei Segment IV verengt und dort nur halb so breit als bei Segment II, dann nach hinten wieder fast lanzettförmig verbreitert, bei Segment VII am breitesten, dieses Segment fast doppelt so breit als das X. Segment und stark so breit als die aufgeblasene Basis, VIII—X wieder abnehmend. II. und III. Segment mit einem Querkiel, das X. Segment schwach $\frac{1}{2}$ so lang als das neunte. Oberer Anhang nicht ganz doppelt so lang als das X. Segment, nach hinten gebogen herabhängend, das erweiterte Ende von unten nach oben schräg abgestutzt. Etwas jenseits der Mitte an der Unterseite ein runder Höcker, der mit etwa 6 sehr kleinen Zähnen besetzt ist, der Unterrand bis zur Abstützung ebenfalls mit solchen Zähnen besetzt. Von oben gesehen erscheinen die Appendices in der 2. Hälfte lanzettförmig erweitert. Unterer Anhang etwa zwei Drittel so lang als der obere, von der Seite gesehen schmal lanzettförmig, etwas nach hinten und oben aufgebogen; von unten gesehen breit dreieckig, die ab-

gestumpfte Spitze stark bifid, die 2 Ecken nach vorn und aussen umgebogen zu einem sehr feinen und spitzen Häckchen. Genitalanhang des II. Segments nicht hervorragend, mit Ausnahme der Hamuli. Vorderlappen nicht entwickelt, dagegen der Hinterrand der Bauchdecke des II. Segmentes stark behaart. Hinterlappen (Genital-lappen) kurz, schmal lanzettlich am Ende abgerundet, fast abgestutzt, etwas behaart. Hamuli sehr auffallend gebaut. Sie sind nämlich einfach lang dornförmig und fast senkrecht abstehend, nach innen gegeneinander geneigt, ihre Spitze hakenförmig nach aussen und hinten gebogen, fast von der doppelten Länge des Genitallappens. Ihre etwas breitere Basis ist auf der Aussenseite mit einer Rille versehen, die schräg nach der Spitze zu läuft bis zur halben Länge des Hamulus. (Dadurch unterscheidet sich die Gattung leicht von den habituell ähnlichen *Neodythemis*, *Allorhizucha*, welche sehr plumpe Hamuli haben, deren Greiforgane von der Seite aus gesehen, nicht oder kaum sichtbar, also maskiert, sind). Beine mässig lang, der Vorderschenkel in der untern Hälfte der Innenseite mit 8 steifen Dornborsten besetzt, die 6 obern sehr kurz, die 2 untern doppelt so lang. Innenseite des mittleren Schenkelpaares ähnlich mit 18 äusserst kurzen Sägezähnen besetzt, die 2 letzten wieder länger. Beim hintern Schenkelpaar diese Sägezähne endlich nur in Form kleiner Höckerzähne vorhanden. Klauenzahl normal, klein (d. h. kaum $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ des Klauenendes, das ihn weit überragt). Die übrigen Wimpern der Beine etwas länger als die längsten Dornborsten, zart. Flügel lang, vorn schmal und spitz, das Abdomen an Länge übertreffend. Vorderflügel auch an der Basis schmal, Hinterflügel an der Basis über doppelt so breit als der Vorderflügel, fast doppelt so breit als im Niveau des Pterostigma. Membranula der Hinterflügel ziemlich gross, 1 Analzelle lang (fast so lang als der davor liegende Teil der Flügelbasis breit ist), lanzettförmig. Im Vorderflügel 11—12 Antenodalqueradern, die letzte in den Subcostalraum verlängert, 8—12 Postnodalqueradern. Im Hinterflügel 9 Antenodal-

queradern, 10 Postnodalqueradern. Der Arculus ist im Vorder- und Hinterflügel zwischen der 2. und 3. Antenodalquerader gelegen und zwar gleich nach der 2. Querader, die Innenseite des Dreiecks im Hinterflügel in seiner Verlängerung. Vorn die Sectors arculi bis zur Hälfte der davor liegenden Antenodalzelle gestielt, hinten drei Viertel Zelllängen weit. Im Brückenraum vorn und hinten je eine Querader. Der Nodalsector in der Mitte schwach, aber deutlich convex nach vorn, der Subnodalis fast gerade, im Hinterflügel beide Sektoren entsprechend gestreckter. In beiden Flügeln der Hilfssector hinter dem Subnodalis gegen das Ende zu dem letztgenannten Sector stark genähert, mit einer Zellreihe zwischen beiden Sektoren. Discoidaldreiecke coincident, das Dreieck im Vorderflügel fast gleichschenkelig, seine Innenseite wenig kürzer, zweimal so lang als die Vorderseite, die äussere etwa $2\frac{1}{4}$ mal so lang als die Vorderseite. Hauptdreieck mit 1 Querader, Hypertrigonalraum ungeadert, Subtrigonalraum (Nebendreieck) dreizellig, breit. Sectors trianguli ungefähr aus einem Punkte, der vordere sanft gebogen, convex nach vorn, sodass das Discoidalfeld auf der Mitte verschmälert wird. Er endet im Niveau der 3. Postnodalquerader. Der Sector inferior trianguli nur im basalen Drittel deutlich und im allgemeinen dem vordern parallel. Discoidalfeld bis über die Mitte hinaus mit 2 Zellreihen und 6 Randzellen. Das Postcostalfeld beim Arculus 2 Zellen breit. Im Submedianraum die normale Querader. Pterostigma ziemlich lang. Im Hinterflügel der Postcostalraum beim Arculus 6 Zellen breit, der Innenrand (Analsaum) breit gerundet, zwei Submedianqueradern, die äussere schräg, also ein Nebendreieck vorhanden. Cardinalzelle und deren Hypertrigonalraum ungeadert. Sectors trianguli aus einem Punkt, der Sector superior trianguli gleichmässig gebogen. Er erreicht den Hinterrand etwa eine Antenodalzellenlänge vor dem Arculus, der Sector inferior trianguli erst bis zur Mitte dem obern parallel, dann gleichmässig gegabelt, die Gabeläste schräg und schwach gebogen dem Hinterrand zulaufend. Gabel in der Mitte

3 Zellen breit, mit 8—9 Randzellen. Discoidalfeld mit 2 Zellenreihen bis zur Mitte, mit 12—14 Randzellen.

Type der Gattung ein ♀ der mir unbekannten *A. biordinata* Karsch von Kitope (Südostküste), das ♂ nach *A. leopardina* n. sp.

Atoconeura leopardina n. sp.

♂ ad. Körperlänge 36 mm, Flügelspannung 68 mm, Länge eines Hinterflügel 32 mm, des Abdomens 28 mm, Gesicht gelb. Schwarz bis schwarzblau sind: Die Oberlippe, der Basalrand des Nasus und der Ocellenwulst. Stirn dreifarbig. Ihre Vorderkante schwarzbraun, die Oberseite metallisch blau und je ein grosser Fleck von der Ecke bis zur Augennaht gelb. Unterlippe gelb mit grossem quadratischem, schwarzem Fleck, dessen Vorderseite bis zum Vorderrand spitz ausgezogen ist. Hinterhaupt schwarz, Schläfen gelb, in der Mitte schwarz geteilt. Prothorax mattschwarz, der Basalrand, ein in der Mitte schwarz geteilter medianer Längsstrich auf dem Mittelfeld und ein einfacher medianer Längsstrich auf dem Hinterrand gelb. Der herzförmige Mittellappen gelb gesäumt, mit sehr langen, weichen, braungelben Haaren besetzt. Thorax schwarz mit blauem Metallschimmer, der Mittelkiel der Vorderseite feingelb, ebenso eine in der Mitte nach hinten winkelig gebogene Binde auf der 1. Seitennaht (Grenznaht), an der Basis der letzteren, jedoch getrennt, ein grosser gelber Fleck. Ein ebensolcher Fleck an der Basis des Mittelfeldes. Gelb sind ferner: Drei rundliche Flecke nahe der Flügelbasis, ein länglicher Fleck auf dem mittleren Seitenfelde und der Hinterrand der Thoraxseiten, (oder auch: Thoraxseiten gelb, von unregelmässigen, blauschwarzen, anastomosierenden Binden durchzogen). Oberseite des Thorax mit 6 gelben Flecken in der Mitte, zuerst ein rechteckiger, dann ein dreieckiger mit je einem Punkt zu beiden Seiten der Hinterecke, dann ein rechteckiger Längsfleck und zuletzt am Hinterrande ein queres gelbes Rechteck. Abdomen mattschwarz, Segment I oben mit dreieckigem gelbem Fleck am Hinterrande,

Segment II oben mit flaschenartigem, hinten breiterem gelbem Längsfleck, seine Basis wollhaarig. Längskiel von Segment III—V fein gelb oder braungelb, ebenso ein rundlicher Fleck auf Segment VII, nahe der Basis. Unterseite des Thorax hellbraun, etwas weisslich bereift. Basis der Seiten von Segment I gelb gerandet, am Hinterrande des Segments 2 runde gelbe Seitenflecke. Quer über die Seite von Segment III ein kommaförmiger Fleck, dahinter ein Punkt. Basis von Segment IV—VI auf der untern Hälfte der Seiten und auf der Unterseite gelb geringelt, bei VII kaum merklich. Die 3 letzten Segmente und die Appendices anales mattschwarz. Beine schwarz, Hüften teilweise gelb, Innenseite der Vorderschenkel gelb liniert. Flügel hyalin mit schwarzem Geäder. Pterostigma 3 mm lang, besonders vorn schwarz, in der Mitte dunkelbraunrot. Membranula grau, an der Basis heller. Alles übrige in Gattungsdiagnose.

Heimat: Nguelo im Berglande von Ost-Usambara.

Ein einziges ♂ in coll. Foerster, von *A. biordinata* Karsch durch das blauschwarze Netzwerk der Thoraxseiten verschieden, die bei *biordinata* einfach blauglänzend mit 2 gelben Binden sind. Karsch kannte allerdings nur das immature ♀, sodass die Identität beider Formen immerhin möglich wäre.

Die afrikanischen Species der Gattung *Orthetrum* (mit Ausnahme von *Orthetrum Sabina-africana* Selys).

Ogleich nur wenige Species von *Orthetrum* bisher in Afrika gefunden sind, und die bekannten Arten meist eine weite Verbreitung besitzen, herrscht doch, soweit ich erkennen kann, ein ziemliches Durcheinander in der Auffassung der einzelnen Arten. Da das junge, frisch geschlüpfte Männchen in der Färbung in der Regel mit dem jungen und semiadulten ♀ übereinstimmt, die alten ♂♂, seltener die alten ♀♀ dagegen so stark pruinosa zu werden pflegen, dass jede Zeichnung schwindet, so muss jeder Versuch, die Arten nach der Zeichnung allein zu trennen,

scheitern, sobald man nicht jüngere Tiere hat. Die Ähnlichkeit der pruinosen ♂ ♂ der einzelnen Species geht sehr weit, so z. B. bei *trinacria* und *brachiale*. Es empfiehlt sich daher, zur Trennung Charaktere zu benützen, welche sich im Alter nicht verändern. Calvert hat zu seinem Versuch (Burmeisters Types of Odonata, Philadelphia 1898), die Arten zu bestimmen, die gelbe oder gelbbraune Färbung der Flügelbasis benützt. Aber diese ist so unbedeutend und wie vorausszusehen auch oft ganz fehlend, anderseits wieder bei manchen Aberrationen des ♀, z. B. bei *trinacria*, *Abbotti*, *contractum* sehr ausgedehnt, sodass es mir nicht möglich war, mit Calverts Tabelle meine Arten sicher zu bestimmen und ich das Material ganz neu ordnen musste. Ich kam nun zu der Ansicht, dass das *Orthetrum brachiale* Beauv., das in den Berichten eine höchst fragliche Rolle spielt, immer auf sehr reife ♂ ♂ von *chrysostigma* basiert ist, oder aber, wenn dies nicht der Fall, eine Verwechslung mit dem dem *chrysostigma* äusserst ähnlichen *O. trinacria* vorliegt. Der gelbe Achselstreif der Thoraxseiten ist nämlich sehr oft pruinös zugedeckt, er ist besonders bei *Abbotti* sehr schwach, bei *caffrum* am stärksten, während *trinacria* und *contractum* ihn überhaupt nicht besitzen. Ich habe ihn daher nur bei denjenigen Arten benutzt, welche ihn auch im höheren Alter noch zeigen, aber mehr als sekundäres Trennungsmerkmal. Gewiss ist die Form der Hamuli auch zu benützen, diese sind aber bei vielen besonders alten Tieren durch die Begattung verbogen, mit Exsudationen verklebt und bilden oft mit dem ausgetretenen Penis eine einzige unkenntliche Masse. Sie sind bald nach innen gerückt, bald auseinander geschoben und bieten so in der Seitenansicht ein variables Bild. Gerade so verhält es sich mit ihrer relativen Länge und der der Genitallappen. — Die *Thermorthemis*-Arten sind selbstredend hier fortgelassen, ebenso das *Orthetrum Ransonnети*, das wie *O. Lorti* Kirby wahrscheinlich gar kein *Orthetrum*, sondern eine blaue bereifte *Trithemis* aus der *stictica* oder *Distanti*-Gruppe ist, es ist mir wenigstens bis jetzt noch nie ein echtes *Orthetrum* mit 9—10 Antenodales unter

die Hände gekommen. Über *Orthetrum Sabina-africana* Selys und seine Stellung zur neotropischen Gattung *Lepthemis* will ich mich a. a. O. äussern, jedenfalls ist es ein Unding, diese Species von dem indischen Typus *Sabina Drury* als Gattung abzutrennen, wie einzelne Autoren vorschlagen. Calvert hat über diese Frage ein interessantes Material geliefert (*Proceedings of the Academy of Nat. Sciences, Philadelphia 1899. pg. 238*).

Die nachfolgende Tabelle enthält somit nur diejenigen echten *Orthetrum*-arten der afrikanischen Fauna, welche in meiner Sammlung vertreten sind, in der also *Ranssoneti Brauer*, *Misthotus ambiguus*, *O. flavidulum* und *Misthotus Marshalli Kirby*, sowie *Orthetrum brevistylum Kirby*, *O. Phillipsi* und *Lorti* fehlen, deren Gattungszugehörigkeit dem Autor z. Tl. selbst zweifelhaft ist, oder welche nicht mit den benachbarten Species verglichen sind. Dem kurzen *Pterostigma* nach ist *O. Phillipsi* vielleicht ein sehr pruinoses ♂ von *Caffrum* oder nahe bei *Caffrum*, ein echtes *Orthetrum* ist es jedenfalls. *M. ambiguus* und *Marshalli* wären mit *O. azureum* zu vergleichen. Doch dürfte meine Tabelle wenigstens die weitverbreiteten Species enthalten und es auch leicht sein, noch sicher zu erwartende neue Arten von denselben Gesichtspunkten aus einzuordnen. So hoffe ich, dass meine Charakterisierung der afrikanischen *Orthetrum*-Arten einen kleinen Fortschritt darstellt an dem Werk, zu dem Calvert den Grundstein gelegt hat

Bestimmungstabelle der Männchen.

1. Abdomen aus breiter Basis bis zum Ende gleichmässig verschmälert, an der Basis von Segment IV nicht oder nur undeutlich eingeschnürt. Segment IV nur wenig schmaler als Segment II. *Pterostigma* gelb. (Hierher gehören auch die europäisch-asiatischen in Nordafrika gefundenen Species *caerulescens* und *bruneum*, die ich hier, als bekannt, weglasse.) (2.)
2. *Pterostigma* 4 mm und mehr lang, breit, Mittelkiel der Thorax-Vorderseite gelb, das Feld auf seinen Seiten dunkler.

3. Die Queradern des Subcostalraumes gelb, besonders auf der Unterseite
= *O. nitidinervis* De Selys.
31. Die Queradern des Subcostalraumes schwarz
= *O. farinosum* Foerster (*pollinosum* Karsch).
21. Pterostigma höchstens 3 mm lang, schmal (Mittelkiel der Thoraxvorderseite dunkelbraun, Seitenfeld heller)
= *O. azureum* Ramb.
11. Abdomen an der Basis eiförmig bis kugelig aufgeblasen, an der Basis von Segment IV bis zur Hälfte verschmälert (eingeschnürt). Pterostigma 3½ mm oder kürzer.) (4.)
4. Queradern des Subcostalraumes wie das ganze Geäder schwarzbraun oder schwarz. Pterostigma gelbbraun, das vordere Drittel seiner Breite schwarz
= *O. contractum* Burm.
41. Wenigstens die Subcostalqueradern weissgelb, besonders von unten gesehen. (5.)
5. Pterostigma gelb, längs des Vorderrandes im Anschluss an die Randader um ein Drittel seiner Gesamtbreite schwarz gerandet. Basis des Abdomens sehr stark aufgeblasen, d. h. von der Seite gesehen bei Segment II, fast so hoch als die Länge von Segment I—III beträgt, über 4mal so hoch als Segment IV. Thoraxseiten olivengrün mit schwarzen Binden, die 2 schwarzen Binden der vorderen Thoraxkanten an der Basis verbunden, keine breite gelbe Achselstrieme auf den Thoraxseiten
= *O. trinacria* De Selys.
51. Pterostigma ganz gelb, oder der Vorderrand nur sehr schmal schwarz gesäumt. (Basis des Abdomens schwächer aufgeblasen, bei den meisten Formen von der Seite gesehen nur etwa 3mal so hoch als Segment IV, oder weniger.) (6.)

6. Thorax vorn einfarbig hellgrün oder oliv, mit zwei dünnen, unten nicht zusammenfliessenden schwarzen Striemen auf der vordern Seitenkante, der Mittelkiel der Vorderseite nicht oder kaum schwarz liniert, bei pruinosen Stücken die ganze Vorderseite des Thorax einfarbig. Thoraxseite vorn mit einer mehr-minder deutlichen gelben Achselstrieme. (7.)
7. Pterostigma 3—3½ mm. Ist eine gelbe Achselstrieme sichtbar, so ist dieselbe gerade und mündet unter der Wurzel des Vorderflügels, eine hintere entsprechende Strieme fehlt. Vorderflügel gelb liniert
= brachiale Beauv (chrysostigma Burm).
71. Pterostigma nur 2½ mm lang, schmal. 2 gelbe Achselstriemen, eine unter dem Vorderflügel, die zweite unter dem Hinterflügel. Ist die hintere pruinös zugedeckt, so erkennt man die Art an der vordern gelben Strieme. Diese ist nicht gerade, sondern stark convex nach vorn und oben und endet daher nicht unter der Flügelwurzel, sondern hinter derselben in der Interalkante. Sie ist auf beiden Seiten schwarz oder braun gerandet. Vorderschenkel wenigstens beim alten ♂ ganz schwarz.
= *O. caffrum* Burm.
61. Thorax vorn hellgrün, mit 2 kräftigen, im Alter zusammenfliessenden Striemen auf der vordern Seitenkante, über den Mittelkiel und das angrenzende Seitenfeld eine kräftige dunkle Längsbinde, sodass auf der Vorderseite 2 ungefähr rechteckige helle, dunkel umrahmte Felder entstehen. (Keine breiten gelben Achselstriemen vorhanden.) (8.)
8. Stirn einfarbig oliv = *O. Abbotti* Calvert.
81. Stirn zweifarbig, oliv, schwarz gerandet
= *O. Wrighti* De Selys und stemmale Burm.

Bestimmungstabelle der ♀ ♀.

1. Pterostigma 4 mm lang oder länger, gelb, breit. (Hierher das ♀ von nitidinervis De Selys, das ich nicht kenne.)

Mitte der Thoraxvorderseite hellgelb wie der Interalarraum, das Seitenfeld dunkler, braungelb

= *O. farinosum* Foerster (*pollinosum* Karsch).

11. Pterostigma nur 3 mm lang (2).

Mitte der Thoraxvorderseite mehr oder weniger dunkelbraun oder schwarz, das Seitenfeld gelb, d. h. der mittlere dunkle Teil jeder Seite von einer gelben Antealarbinde begrenzt, oder Thoraxvorderseite einfarbig (2).

2. Queradern im Subcostalraum dunkelbraun oder schwarz (3).

3. Pterostigma im vordern Drittel schwarz gesäumt, sonst heller. Schenkel der beiden hintern Beinpaare an der Basis scharf abgesetzt schwarz geringelt

= *O. contractum* Burm.

31. Pterostigma am Vorderrand ausser der schwarzen Randader nicht schwarz, sondern ganz gelb. Schenkel der zwei mittleren Beinpaare olivengrün oder gelblich, an der Basis höchstens schwärzlich angeraucht, dann die schwarze Färbung unbestimmt begrenzt, allmählich verlaufend

= *O. azureum* Ramb.

21. Queradern im Subcostalraum gelb, besonders auf der Unterseite (4).

4. Pterostigma hinter der schwarzen Randader im vordern Drittel schwarz gesäumt, sonst gelb. Schenkel der beiden hintern Beinpaare schwarz. Abdomen stark aufgeblasen, Segment II etwa 3mal so hoch als Segment IV, von der Seite gesehen. Basis- und Enddrittel von Segment IV—VI schwarz, Mitte gelb, letzte 3 Segmente schwarz. Stirn einfarbig

= *O. trinacria* De Selys.

41. Pterostigma mit Ausnahme der schwarzen Randadern ganz gelb oder, nur schmal, schwarz gesäumt; bei stemmale-Wrighti dann aber die Stirn zweifarbig. Schenkel der Mittel- und Hinterbeine wenigstens in der oberen Hälfte gelb oder oliv, die untere schwarz. Abdomen in der Regel bei Segment II weniger als 3mal so hoch als bei Segment IV (5).

5. Abdomen an der Basis von Segment IV nur wenig dünner als bei Segment III, also von oben gesehen kaum eingeschnürt, das IV. Segment ungefähr $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ so breit als das zweite. (Plumpere Tiere.) (6.)

6. Beine ganz gelb bis auf die Tarsen. Costal- und Medianader auch nach dem Nodus deutlich gelb, ebenso ihre Queradern. Thoraxseiten mit 2 breiten gelben narbigen Achselbinden

= *O. caffrum* Burm.

61. Beine nur teilweise gelb, d. h. die Basis der Schenkel und deren Innenseite, sowie die Aussenseite der Schienen schwärzlich. Medianader und die davor liegenden Queradern nach dem Nodus nicht mehr deutlich gelb, sondern dunkel, braunschwarz. Auf den Thoraxseiten nur eine vordere gelbe Achselbinde, mehr-minder deutlich entwickelt

= *O. brachiale* Beauv. (*chrysostigma* Burm).

51. Abdomen an der Basis von Segment IV stark verjüngt, dort nurmehr höchstens die Hälfte so breit und hoch als bei Segment II. (Kleinere, schlankere Tiere.) Ohne auffallende breite, gelbe Achselstriemen (7).

7. Stirn (Nasus) zweifarbig, oliv, schwarz gerandet. Schenkel der beiden hintern Beinpaare fast ganz schwarz, Pterostigma etwas schwarz gerandet, aber nicht $\frac{1}{3}$ seiner Breite

= *O. stemmale-Wrighti* De Selys.

71. Stirn (Nasus) einfarbig gelb oder oliv, Schenkel der beiden hintern Beinpaare gelb, im höchsten Alter bisweilen an der Basis schwärzlich, aber dann nicht schwarz geringelt wie brachiale und contractum. Körper fast ganz gelb, die Seiten des Abdomens von Segment IV ab auffallend schwarz liniert

— O. Abbotti Calvert.

Orthetrum Sabina Drury Rasse *africana* De Selys.

Diese Art ist von De Selys nach Stücken aus Kamerun beschrieben worden. Ich besitze ein altes Männchen, das ich der Güte des leider nun verewigten Herrn Missionar Bohner verdanke und das in Mbundjo am untern Mungo oder Mongo im Bakundulande gefangen worden ist. Es ist vollständig blau bereift und gehört in unserer Tabelle, da es ein stark aufgeblasenes Abdomen und schwarze Subcostalqueradern hat, zu 4. mit contractum in dieselbe Abteilung, unterscheidet sich aber sofort durch den langen dünnen Hinterleib von allen Arten mit aufgeblasenem Abdomen. Der Hinterleib ist nämlich bei *africana* deutlich länger als der Hinterflügel (um etwa $\frac{1}{7}$), bei contractum und den genannten Verwandten deutlich kürzer.

Orthetrum julia Kirby.

Kirby vergleicht sein *Orthetrum julia* von Sierra Leone leider nicht mit *trinacria* De Selys. In der Farbe und Grösse stimmt es nach Beschreibung und Abbildung vollkommen mit *trinacria* überein. Jedenfalls ist es gut, der Beschreibung so schwieriger Tiere genaue Unterscheidungsmerkmale von den nächstverwandten Formen mitzugeben. Mit *Sabina-africana* hat *julia* direkt nichts zu tun. Seine Zeichnungen sind sehr kräftig. Ich finde, dass die ostafrikanischen Arten in Westafrika immer etwas Melanismus zeigen, wohl im Einklang mit den meteorologischen Verhältnissen, so z. B. contractum, das in Kamerun in einer Form mit oft fast schwarzem Thorax fliegt

(*Subrase nigrescens*), so brachiale, das im Westen durch das etwas kräftiger gefärbte *chrysostigma* vertreten ist. Ebenso scheint es mit *trinacia-julia* zu sein. Durchgreifende Unterschiede scheinen zu fehlen, bezw. sind noch vom Autor nachzutragen. Diese Art besitze ich nicht.

Orthetrum flavidulum Kirby (*Misthotus* fl. K.).

Kirby glaubt nun, dass diese aus Transvaal stammende Art im männlichen Geschlecht kein kugelig aufgeblasenes Abdomen habe, also zur *caerulescens-bruneum*-Gruppe gehöre. Es ähnelt dem ♀ von *caffrum*, dürfte aber verschieden sein.

Orthetrum Abbotti Calvert.

Thoraxvorderseite gelbgrün. Mediane Carina und Rand des Antealarsinus schwarz. Neben der Carina ein schwarzer Streif, sodass die Mitte der Thoraxvorderseite mit ziemlich breiter schwarzer Binde versehen ist. Hierauf nahe der vordern Seitenkante eine schwarze Binde, welche den Antealarsinus nicht ganz erreicht, sowie eine ebensolche über die vordere Grenznaht der Thoraxseiten. Es folgen dann noch vier weitere schwarze Binden, eine vor der ersten eigentlichen Seitennaht, eine über das Spiraculum, eine über die zweite, eigentliche letzte Seitennaht und eine über die Mitte des hintersten Seitenfeldes, den Oberrand nicht erreichend. Auch Abbotti hat also von der Schulterbinde angefangen jederseits 6 Binden. Im Alter fließen zusammen: Die Schulterbinde und die Binde über die Grenznaht, ferner die 2 folgenden Binden (diejenige über die erste eigentliche Seitennaht mit der Binde über das Spiraculum). Bei jungen, nicht pruinosen Männchen sind oft nur die beiden vordersten Binden an der Thoraxseite deutlich, die übrigen Binden schattenhaft, beim jungen ♀ oft alle schattenhaft oder sie fehlen ganz. Beim ♂ ist der äussere Ast des Hamulus etwas nach vorn zu einer stumpfen Spitze vorgezogen. Beim reifen ♂ ist das Abdomen in der Regel erst von Segment III ab ganz

blau, das Hinterschildchen des Thorax braungelb, ferner sind gelb: Ein Fleck auf Segment I, ein basaler Ring auf Segment II, sowie ein kleiner Fleck vor dem medianen Querkiel und ein grosser Fleck hinter dem Kiel von Segment II. Aberration ♀ flava. Die Flügelbasis vorn bis über den Arculus hinaus und bis zur Postcostalader gelb, im Hinterflügel bis zur Aussenecke des Dreiecks und nach hinten bis ans Ende der Membranula, sonst typisch.

Orthetrum brevistylum Kirby.

Ist nach Kirby dem *O. caerulescens* sehr ähnlich, unterscheidet sich aber von allen Species dadurch, dass die *Sectores arculi* getrennt aus einem Punkt entspringen oder aber nur sehr wenig an der Basis vereinigt (gestielt) sind. Die verlängerte Antenodalquerader, der wellige Nodalsector, die 11—12 Antenodalqueradern im Vorderflügel und die 3 Reihen Discoidalzellen würden zu *Orthetrum* stimmen. Leider sagt Kirby nichts über 2 andere wichtige Merkmale, nämlich über die Form des Prothorax und des Ocellenwulstes. Somaliland.

Aeschna usambarica nov. sp.

♂ Körperlänge 60 mm, Flügelspannung 80—85 mm, Länge des Abdomens 45—50 mm, eines Hinterflügels 39—41 mm, des Pterostigma 2½ mm, der obern Appendices anales 5 mm, unterer Anhang, gut ein Drittel so lang als der obere, etwa 1¾—2 mm lang.

Das ganze Gesicht grünlichgelb, Unterlippe und Mundteile kastanienbraun, Stirnkante bogenförmig. Stirn oben eben, kurz gewimpert, auf der Seite vor den Fühlern sehr stark, fast büschelig. Oberseite der Stirn hellgrün oder gelblich, der Ocellenwulst, die obere Augennaht sowie ein scharf abgesetzter, pentagoner, das mittlere Drittel der Stirnfläche ausfüllender, von der Basis bis zur Vorderkante reichender Fleck schwarz. Die Seitengrenzen des schwarzen Stirnflecks etwas schräg nach vorn und aussen. Hinterhauptsdreieck gelb, das Hinterhaupt

chokoladebraun, die Schläfen schwarz. Prothoraxvorder-
rand gelblichbraun, etwas aufgebogen, durch eine tiefe
Rille vom Mittelstück getrennt, dieses brustförmig steil,
in der Mitte mit einem dreieckigen Spalt, auf den Seiten
mit je einer bogenförmig begrenzten Höhlung, sein Hinter-
rand nieder bogenförmig, in der Mitte eingekerbt, mit
sehr langen Wimpern besetzt. Farbe chokoladebraun,
oben etwas grünlich. Thorax schön sammtbraun, mit 2
hellgrünen, keilförmigen, oben breiter werdenden und
convergierenden Antehumeralbinden. Antealarsinus innen
hellgrün, ebenso die Anteralarflecken. Seiten des Thorax
mit 2 hellgrünen oder gelben Subalarbinden, die vordere
1 mm breit, die hintere 1½ mm. Abdomen ganz dunkel
chokoladebraun, oben schwärzlich, wahrscheinlich ohne
hellgrüne Flecken auf der Oberseite. Auf der Seite von
Segment I ein hellgrüner Fleck am Hinterrand, von
Segment II ein ebensolcher Fleck in der vordern Hälfte,
vor dem Querkiel. Seitanhang des II. Segmentes ungefähr
dreieckig, ohne Höckerzähnen, glatt und glänzend.
Untere Hinterecken des II. Segmentes nach unten in 2
breite, gerundete, hinten etwas längere Lappen ausgezogen,
die am Unterrande mit Höckerzähnen dicht besetzt sind.
Sonst vom Genitalanhang nichts hervortretend. Abdomen an
der Basis stark aufgeblasen, auf der Mitte des III. Segmentes
eingeschnürt und stark verschmälert. Von der Seite gesehen
Segment II etwa 5 mm hoch, Segment III an der Einschnürung
nur 2 mm hoch, die hintern Segmente dann wieder 2¼ mm.
Von oben gesehen ist das Abdomen bei Segment II fast
5 mm breit, an der Einschnürung 1½ mm, dann fast bis
zum Ende wieder 3 mm breit. Obere Appendices anales
schwarzbraun, schmal lanzettlich mit stumpfer Spitze, an
der Basis dünn, dann etwa vom zweiten Drittel ab bis
zum Ende fast gleichmässig ½ mm breit, der Aussenrand
gerade, der Innenrand fast parallel, am Ende gebogen,
mit Wimperharen von über ½ mm Länge besetzt. Unterer
Anhang dreieckig, an der Spitze abgestutzt und dort in
der Mitte etwas eingekerbt, reichlich ein Drittel des obern
lang. Beine schwarz, die Basis der beiden vordern Paare

rotbraun, ebenso die obere Hälfte der Schenkel des hintersten Beinpaares. (Beim unreifen Tier ausgedehnter rot). Flügel. Costalader vorn schwarzbraun, das Geäder schwarz, ebenso das 2½ mm lange, sehr schmale Pterostigma, dessen innere Grenzader als schräge Ader verlängert ist. Subnodalsector zwei Postnodalzellen vor dem Beginn des Pterostigma gegabelt. Im Brückenraum vorn 3, hinten 2—3 Zellen, die schiefe Querader etwa 1 Zelle nach dem Niveau des Nodus gelegen. Innenseite des Dreiecks im Hinterflügel 2½ mm lang, die äussere 4 mm. Die Art gehört also nach Williamson in die Gattung *Aeschna* s. str. Alle 4 Dreiecke vierzellig, da die Innenzelle durch eine Längsader geteilt ist. Der Arculus liegt etwas nach der zweiten Antenodalzelle, die Innenseite des Dreiecks eine Zelle nach dem Arculus. Vorn 14—17 Antenodalqueradern, die erste und vierte oder die fünfte verdickt, 10—11 Postnodales, hinten 9—10 bzw. 11—12. Der Sector brevis etwa 8 Zellängen vor seinem Ende gegabelt, der vordere Gabelast alsbald in den Mediansector einmündend. Gabelast des Nodalsector 3—4 Zellen breit. Raum zwischen dem Hilfssector und dem Subnodalis an der breitesten Stelle (hinter dem Gabelpunkt) 3 Zellen breit. Der Nodalsector dem *S. principalis* hinter der Mitte des Pterostigmas am stärksten genähert, dort zwischen beiden 2 Zellreihen. Beim Analdreieck die Basalzelle der Länge nach geteilt, also das ganze Dreieck dreizellig. Membranula breit dreieckig, ihr Innenrand bis zum Ende der Basalzelle des Analdreieckes reichend. Vorderseite so lang als die Aussenseite, die Basalhälfte schneeweiss, die Endhälfte scharf abgeschnitten schwarz. Der Analrand vor der Ecke stark eingebuchtet.

♀ juv. Körperlänge, ohne die am vorliegenden Stück abgebrochenen Appendices anales, 60 mm lang, das Abdomen 45 mm. Explanatio alarum 95 mm, Länge eines Hinterflügels 45 mm, seine grösste Breite im Niveau der Hinterecke des Dreiecks 13 mm. An den Beinen das Rot etwas ausgedehnter als beim alten ♂. Costalader vorn heller (beim ♀ adult. jedenfalls auch dunkel). Flügel sonst hyalin, die vordern

an der Basis bis über den Arculus hinaus, die Hinterflügel ebensoweit und nach hinten bis zum Ende der Membranula, alle 4 Flügel vom Nodus bis zur Spitze citrongelb (im Alter wohl bräunlichgelb). Pterostigma hellgelb. Abdomen an der Basis etwas schwächer aufgeblasen als beim ♂, auf der Mitte von Segment III nicht eingeschnürt. Sonst wie das Männchen.

Es wäre möglich, dass *A. usambarica* eine Rasse von *A. Ellioti* Kirby vom Runsoro ist oder ganz identisch. Über den schwarzen Stirnfleck der *Ellioti* sagt Kirby nur: Stirn um den Ocellenwulst schwarz, während unsere Art einen scharf begrenzten, vollkommen pentagonalen Stirnfleck hat. Das Abdomen ist bei *usambarica* anscheinend ganz braunrot, bei *Ellioti* grün gefleckt, doch könnten die grünen Flecken durch Fettsäure zerstört worden sein. Leider ist Kirbys Beschreibung für so kritische Arten (man denke nur z. B. an *A. juncea* und *caerulea*) etwas kurz. Die Beschreibung des Kleingeädern ist bei Aeschniden oft wenig wertvoll, weil dieses entweder für viele Formen konstant, oder aber individuell variabel ist. *Aeschna dolabrata* Karsch vom Kapland hat eine T-förmige Zeichnung auf der Stirn, *Aeschna Rileyi* Calvert vom Kilimandjaro eine brillenförmige, schwarze Binde entlang der Stirnkante, welche durch einen runden Fleck mit dem Schwarz des Ocellenwulstes in Verbindung steht, u. a. m.

Vorkommen: Nguelo, Bergland von Ost-Usambara. Beschrieben nach 2 ♂ ♂, 1 ♀ in meiner Sammlung.

Umma declivium n. sp.
(Cleis De Selys).

♂ Körperlänge 50—55 mm, Länge des Abdomens 42—45 mm, Flügelspannung 70—75 mm, Länge eines Hinterflügels 33—35 mm, seine grösste Breite, im Niveau des Ursprungs des Ultranodalsectors gemessen, 8½—9 mm. Länge der obren Appendices anales 1½ mm.

Flügel hyalin, mit schwarzem Geäder, im Alter rauchig braun getrübt, in beiden Geschlechtern ohne

Pterostigma. Vorn 24—25 Antenodalqueradern. Arculus sehr deutlich gebrochen, so stark wie sonst bei keiner andern Ummaart, ähnlich wie bei Sapho, aber der Hinterleib nur um $\frac{1}{4}$ länger als der Hinterflügel, während er bei Sapho um ein Drittel länger ist. Innerer Ast des Sector inferior trianguli fein, wie bei den übrigen Ummaarten schräg nach innen und hinten gerichtet, dann nach innen gebogen. (Bei Sapho ist er dick, senkrecht auf den Hinterrand gerichtet.) Sector superior trianguli am Ende gegabelt, bei Sapho ungegabelt.) Im Vierseit vorn 6—7, hinten 4 Queradern. Der Sector principalis steigt nach 4—5 Zellängen zur Medianader empor und ist mit ihr dann etwa 4 Zellen weit verschmolzen. Gleich nach der Trennung der beiden entspringt der Sector subnodalis, der Nodalsector etwa 1 Zelle nach dem Niveau des Nodus, alles wie bei den westafrikanischen Ummaarten, mit welchen die Art auch im übrigen Geäder übereinstimmt.

Körper fast durchaus mattschwarz, ausserdem metallisch grün. Oberlippe, Rhinarium und Nasus glänzend schwarz, erstere etwas bläulich mit einer medianen Punktgrube, ihr Seitenrand bis zum Augenrand gelb. Nasus oben fein quergerunzelt, mit zwei oval begrenzten Grubeneindrücken, zerstreut schwarz bewimpert. Prothorax mit halbkreisförmigem, in der Mitte nicht deutlich eingekerbtem Hinterrand, seine Seiten glänzend metallgrün. Basaldreieck des Thorax sehr klein, gleichseitig. Vorderrand des Thorax samtschwarz, die Seiten hell metallgrün, mit einer schwarzen Interalarbinde bis zu den Hüften des mittleren Beinpaars. Unterseite schwarz, weisslich bereift. Abdomen fast durchaus mattschwarz, die Seiten von Segment I und II hell metallgrün, die folgenden Seiten bis etwa zur Mitte des Abdomens mit bläulichem Schimmer. Die Segmente bis zum Ende dünn, die letzten Segmente und die Basis kaum merklich dicker. Segment IX unten bei Beginn der zweiten Hälfte mit einem kurzen, dicken, anliegenden, nach hinten gerichteten Dorn, der das Segmentende nicht überragt. Segment X $\frac{1}{2}$ mal so lang als IX, die obern Appendices anales wenig, aber doch deutlich länger als Segment IX,

dick, fadenförmig, von oben gesehen zangenförmig einwärts gebogen, aussen sehr kurz gewimpert und mit kurzen Dornzähnen besetzt, von der Seite gesehen wagrecht, gerade, am Ende nur wenig verdickt. Untere Appendices $\frac{4}{5}$ so lang als die oberen, von der Seite gesehen gerade, am Ende abgestutzt, die obere Ecke etwas ausgezogen. Von unten gesehen aus breiter Basis fadenförmig, schwach nach innen gebogen, am Ende sehr wenig verdickt und dort nicht ganz so breit als die Basis. Beine ganz mattschwarz, wie bei den übrigen Ummaarten, mit langen Wimpern dicht besetzt.

♀. Länge des Körpers 48—50 mm, des Abdomens 38—40 mm. Kopf ganz metallgrün, die schwarzen Fühler vorn nahe der Basis mit einem gelben Fleck, ebenso die Seiten neben der Oberlippe bis zum Augenrand gelb. Basis des Rhinarium schwarz. Prothorax und Thorax ganz grün, die Articulationen fein schwarz, ebenso die Unterseite. Letzte Seitennaht des Thorax mit schmaler gelber Binde, ebenso einige Interalarflecken gelb. Die beiden Appendices anales sehr zart, spitz lanzettlich, so lang als Segment X. Der Fadenanhang der Legscheide wagrecht nach hinten, sehr lang und dünn, das Endniveau der oberen Appendices fast erreichend. Im übrigen wie das Männchen. Das ♀ ähnelt sehr den ♀ ♀ der westafrikanischen Arten, unterscheidet sich aber sofort durch den deutlich stumpfwinkelig gebrochenen Arculus, sowie den Mangel eines Pterostigmas, das ♂ ausserdem durch die ganz samtschwarze vordere Thoraxseite. Ferner sind die Wimpern der Beine deutlich kürzer als bei den westafrikanischen Umma-Arten; diese ausgezeichnete elegante Art gehört aber zweifellos zu Umma Kirby (Cleis Selys), trotz dem fehlenden Pterostigma, in Bezug auf welches ja Analogien bei den Calopteryginen vorkommen, z. B. bei Phaon, Hetaerina.

Vorkommen: Nguelo im Berglande von Ost-Usambara.

Typen ♂ ♂, ♀ ♀ in coll. m.

Libellago auripes n. sp.

♂. Körperlänge 29 mm, Länge des Abdomens 23 mm, eines Hinterflügels 28 mm, des Pterostigma fast 2 mm. Grösste Breite eines Hinterflügels, in der Mitte zwischen Nodus und Pterostigma gemessen 4 mm. Spannung der Hinterflügel 48 mm. Flügel hyalin mit schwarzem Geäder, ihre Basis bis etwas zur drittletzten Antenodalquerader zitrongelb, am äusseren Ende des gelben Feldes der Anflug fast verschwindend. Vorn 10–12, hinten 10–11 Antenodalqueradern, vorn 17, hinten 14 Postnodalqueradern, das Vierseit in Vorder- und Hinterflügel mit je einer Querader.

Körper schwarz mit gelben Zeichnungen, das Abdomen korallrot, schwarz liniert. Gesicht schwarz. Unterlippe in der basalen Hälfte hellgelb, die Mundteile am Ende rostrot. Oberlippe glänzend schwarz, das Rhinarium etwas matter, fein quer gerillt und gerandet, der Rand oben etwas bläulich schimmernd. Übriger Teil des Gesichtes samtschwarz, der Nasus in der Mitte mit einem runden, braungelben Fleck, die Enden der Fühler rotbraun. Goldgelb sind je 1 Punkt seitlich der Fühlerbasis, etwas hinter derselben, dahinter 1 rechteckiges Feld bis zum Hinterrand, dessen Seiten in der Mitte winkelig eingeschnitten sind. Je 1 runder Punktfleck gegenüber dem Einschnitt auf der Mitte des schwarzen Feldes gegen den Augenrand. Prothorax mattschwarz. Vorderrand fein hellgelb gesäumt. Hellgelb sind ferner ein ovaler Längsfleck jederseits der Mitte und der Hinterrand. Der fast lamellenartige abgesetzte Endsaum des Hinterrandes flach bogig und wieder schwarz, das gelbe Feld mit langen, schwarzbraunen Wimpern besetzt. Seiten des Prothorax gerundet vorspringend, dunkel orange gelb, mit langen, schwarzen Wimpern. Thorax schwarz, mit hellgoldgelben Zeichnungen. Basaldreieck klein, etwa so hoch als der Antealarsimus, schwarz. Gelb sind: Der Längskiel der Vorderseite bis nicht ganz zum Antealarsinus, eine vollkommen gerade, wenig breitere Antehumeralbinde, welche nach oben nur bis zum Beginn der letzten zwei Fünftel

der Länge der Vorderseite reicht. Von ihrer Basis aus nach hinten fast convex eine zweite feine Binde, deren oberes Ende fast in der Verlängerung der Antehumeralbinde liegt und dort plötzlich zu einem steigbügelförmigen Fleck erweitert ist, der die Flügelbasis nahezu erreicht. Seiten schwarz, eine breite Interalarbinde gelb, ebenso der Hinterrand breitgelb gesäumt. Unterseite des Thorax gelb, auf dem Felde hinter den Fusswurzeln ein schwarzer, ovaler Ring, der von 2 schwarzen, zu einander senkrechten Linien durchkreuzt ist. Die hintere Hälfte der Längslinie fehlt. Nahe dem Vorderrande ist der Ring durch eine Anastomose mit dem schwarzen Seitenfeld verbunden. Interallarraum der Oberseite schwarz, mit zahlreichen gelben Wulstflecken. Abdomen: Erstes Segment schwarz, ein grosser, rundlich-dreieckiger Seitenfleck, sowie der Hinterrand der Unterseite gelb. Segment II oben schwarz, auf der Mitte jederseits des Längskiels ein mit der Spitze nach vorn zeigender, länglich-dreieckiger gelber Fleck. Auf den Seiten ein ungefähr rechteckiger, vorn bis fast zur Mitte spitzwinkelig ausgeschnittener gelber Fleck. Übrige Segmente korallrot, die Basis besonders von Segment III—VII fein heller, fast gelb, geringelt. Von III—VIII bei jedem Segment das Endfünftel schwarz, ebenso der Längskiel. Das IX. und X. Segment, sowie die Appendices anales ganz schwarz. Das X. Segment nicht ganz halb so lang als das IX., die obern Appendices anales so lang als das IX. Segment. Sie sind von oben gesehen fadenförmig und zangenartig gegeneinander geneigt, am Ende fast dreieckig erweitert, der innere Endrand gerade abgestutzt. Untere Appendices kaum dicker, fadenförmig, ebenfalls zangenförmig nach innen gebogen und etwas nach unten hängend, nur $\frac{1}{4}$ so lang als die obern. Beine tiefschwarz. Die Tibien sind stark erweitert wie bei *Libellago caligata* ($\frac{1}{2}$ mm breit), auf der Aussenseite (Oberseite) lebhaft goldgelb, auf der Innenseite (Unterseite) etwas heller und matter.

Was die übrigen ostafrikanischen *Libellago*-Arten anlangt, so sind bei *consueta* Karsch die Tibien nicht

erweitert, bei *trifaria* Karsch ist das Abdomen oben grün, hat auch andere Zeichnung. Bei *caligata* sind die Tibien aussen karminrot, das Abdomen oben blau, *auripes* auch schlanker gebaut.

Heimat: Nguelo im Bergland von Ost-Usambara, Deutsch-Ostafrika. Typen (2 ♂♂) in meiner Sammlung. ♀ unbekannt.

Pseudagrion De Selys.

De Selys trennt die Gattung *Pseudagrion* von *Caenagrion* Kirby, indem er als einziges Gattungsmerkmal den Ursprung des Sector inferior angiebt, der bei *Pseudagrion* bei der Submedianquerader entspringen soll oder selten ein wenig vorher, bei *Caenagrion* deutlich vorher. Diesem Merkmal fügt Karsch ein weiteres hinzu. Er sagt bei *Pseudagrion*: Prothorax des ♀ nahe dem Hinterrande jederseits mit einem geraden, nach vorn gerichteten Spitzchen; bei *Caenagrion*: Prothorax ohne jede Auszeichnung (Libellen von Adeli). Die afrikanischen *Caenagrion*arten *insulare* De Selys, *rufipes* Ramb. und *punctum* Ramb. gehören voraussichtlich auch zu *Pseudagrion*, sind auch von De Selys nur mit einem Fragezeichen zu *Caenagrion* gestellt. *A. punctum* Ramb. wird schon von Gerstäcker zu *Pseudagrion* gestellt. In meiner Sammlung befinden sich 3 weitere Formen aus der Verwandtschaft des *punctum*, von welchen bei einer durch das Vorhandensein der beiden Geschlechter die Zugehörigkeit zu *Pseudagrion* feststeht. Sie ist bei den andern beiden auch mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, der grossen Verwandtschaft mit *punctum* halber und mit der im folgenden zuerst beschriebenen Art.

Pseudagrion acaciae n. sp.

♂ semiad. Körperlänge 33 mm. Länge des Abdomens 28 mm, des Pterostigma $\frac{1}{2}$ mm, eines Hinterflügels 18 mm, dessen grösste Breite beim Ursprung des Nodalsectors 4 mm. Pterostigma rhomboidisch, graubraun, am Rande

heller, die hintere Aussenseite nicht entwickelt, da die hintere Randader bogig in die äussere Randader übergeht. Die dahinterliegende Zelle die Länge der hinteren Randader etwas übertreffend. Vorn 11, hinten 9 Postnodalqueradern. Der Mediansector entspringt kaum merklich nach dem Niveau des Nodus, der Subnodalis um etwa ein Drittel der Länge der 2. Postnodalzelle nach ihm, der Nodalsector bei der 4. oder 5. Postnodalquerader, der Ultranolalis bei der 8. oder 9. Querader. Beim Vierseit im Vorderflügel die vordere Seite so lang als die innere, die hintere dreimal länger. Im Hinterflügel die äussere Seite $\frac{4}{5}$ der vordern, etwa die Hälfte der hintern. Der Sector inferior trianguli entspringt im Vorderflügel deutlich vor der Submedianquerader, und zwar fast um so viel vorher, als die Querader lang ist, im Hinterflügel näher, fast aus der Querader. Flügel hyalin, das Geäder schwarzbraun. Der Arculus bei der 2. Antenodalquerader. Kopf rostrot. Das 1. und 2. Fühlerglied rostrot, das Endglied schwarz. Eine unterbrochene Binde vom einen Augenrand zum andern über die Ocellen weg, die von ihr mehrweniger deutlich eingeschlossen werden. Die Enden der Binde fleckartig verbreitert. Hinterkante des Kopfes schwarz liniert. Unterseite des Kopfes, des Prothorax und des Thorax gelblichweiss, mit etwas weisser Bereifung. Prothorax rotbraun, das Dreieck an der Basis des brustförmigen Teiles schwarz, ebenso eine sichelförmige Zeichnung von den Enden der Dreiecksbasis convex nach innen bis zur Aussenecke des schwarz linierten Hinterrandes, dessen äusserster Saum flachbogig begrenzt und ebenfalls rotbraun ist. Alle Nähte der Vorderseite des rotbraunen Thorax schwarz gerandet, sodass drei schmale Binden entstehen, eine median über die Carina und 2 Antihumeralbinden. Letztere sind bei Beginn des letzten Drittels plötzlich abgesetzt, die Fortsetzung mehr nach innen verschoben, der Innensaum stark convex. Sie hängen mit der schwarzen Basis des Antealarsinus zusammen. Auf den Seiten eine kurze, wenig deutliche Strieme unter jeder Flügelbasis, die vordere, etwas länger als die hintere, er-

reicht die untere Hälfte des Seitenfeldes kaum. Abdomen blass rötlichbraun, vielleicht etwas oliv im Leben. Erstes Segment an der Basis mit schwarzem Querstrich, zweites mit schwarzem Dreieck im 3. Viertel seiner Länge, vor den beiden Hinterecken des Dreiecks jederseits ein gerader Strich (wie bei *Caenagrion hastulatum*). Am Hinterrande von Segment II ein schwarzmetallischer, pikenförmiger, etwas gestielter Fleck, von dessen Spitze eine lange, schmale, am Ende dreieckig zugespitzte Strieme bis zur Basis des Segmentes sich erstreckt. Nach hinten wird die schwarze Zeichnung immer breiter, Segment VII mit schwarzem Basalring, die schwarze Zeichnung besetzt dort schon die ganze Oberseite, Segment VIII—X schwarz, VIII und IX mit einem schuppenförmigen, hellen Fleck, der bei VIII die vorderen drei Viertel, bei IX die Hälfte des Segmentes einnimmt. Er ist hier sehr undeutlich, im Leben oder bei besserer Erhaltung vielleicht hellgrün, blau oder rötlich. Appendices anales bräunlichschwarz, fast $\frac{3}{4}$ so lang als das in der Mitte des Hinterrandes etwas eingeschnittene Segment X. Von der Seite gesehen sind sie aus breiter Basis verschmälert, der Oberrand gerade, der Unterrand allein schräg nach oben, vor der Spitze mit einem scharfen Einschnitte versehen, wodurch die Spitze fast kopfförmig wird. Untere Appendices so dick als die obern, fadenförmig, von der Seite gesehen scharf nach oben gebogen bis zu senkrechter Richtung, ihre ziemlich scharfen Spitzen gerade gegen die Einkerbung des Unterrandes der obern Appendices gerichtet. Von oben gesehen die obern Appendices etwas gespreizt, aus breiter Basis vom zweiten Drittel ab innen stark ausgebuchtet, sodass dort innen ein zahnartiger Vorsprung entsteht. Enden abgerundet. Die untern von oben gesehen zwei Drittel so lang als die obern, breit schaufelförmig, das Ende fast gerade abgestutzt, rötlich. Beine blassrötlichweiss oder gelb, die Knie und die Bedornung fein schwarz.

♀ semiadult. Körperlänge 35 mm, Länge des Abdomens 31 mm, eines Hinterflügels 22 mm, des Pterostigma

$\frac{3}{4}$ mm, Flügelspannung 45 mm. Vorn 11 Postnodales. Subnodalis eine Zelle später entspringend als beim ♂, auch der Sector inferior trianguli etwas mehr vor der Submedianquerader entspringend. Gesicht mit einer deutlichen schwarzen Querbinde hinter den Ocellen, vor diesen nur ein medianer Querstrich. Der blass gefärbte Hinterrandsaum des Prothorax an den Aussenecken etwas gerundet vorgezogen, an der inneren Basis der Rundung jederseits ein kleines Dornspitzchen (Pseudagrion Karsch). Auf Segment II auf dem $\frac{3}{4}$ Viertel ein schwarzes Dreieck wie beim ♂, ausserdem eine schwarze mediane Längslinie über die ganze Länge des Segmentes. Übrige Segmente wie beim ♂, 1 dreieckiger Seitenfleck auf der Hinterhälfte von Segment IX grünlich, bläulich oder rötlich, das ganze X. Segment ebenso gefärbt. Appendices anales schwarz, sehr kurz, von den hellen Fadenanhängen der Legscheide etwas überragt. Im übrigen wie das Männchen.

Vorkommen: Ein Pärchen von Komatipoort, Transvaal, am 3. Januar 1898 von Herrn Karl Hartmann aus Freiburg i. B. gefangen.

Typen in coll. m.

Dem *Ps. punctum* Ramb. äusserst ähnlich, doch viel kleiner und von *punctum* durch die Form der untern Appendices anales des ♂ sofort unterscheidbar. Bei *punctum* sind nämlich letztere von der Seite gesehen breit dreieckig erweitert, sodass sie an der Basis nach oben eine Art Zahn bilden. *Ps. punctum* Ramb. wurde von Herrn Hartmann gleichzeitig mit *acaciae* erbeutet. Seine obern Appendices sind vor dem Ende auf der Unterseite ebenfalls eingeschnitten.

Pseudagrion Sikorae n. sp.

♂ ad. Körperlänge 29 mm, Länge des Abdomens 24 mm, Flügelspannung 35 mm. Länge des Hinterflügels 17 mm, seine grösste Breite in der Mitte zwischen dem Ursprung des Nodalsectors und des Ultranolis gemessen $3\frac{1}{2}$ mm. Länge des Pterostigma kaum $\frac{1}{2}$ mm.

Flügel hyalin, mit schwarzem Geäder. Pterostigma rhomboidisch schwarz, am Rande fein hell gesäumt, die Hinterseite ungefähr so lang als die Aussenseite, die vordere kaum merklich länger. Die dahinter liegende Zelle um ein Viertel länger als der Hinterrand. Vorn 11, hinten 10 Postnodalqueradern. Der Mediansector entspringt im Niveau des Nodus, der Subnodalis um etwas mehr als ein Drittel (im Hinterflügel um die Hälfte) der Länge der 2. Postnodalzelle nach dem Niveau des Nodus, aus der Nodalquerader, der Nodalsector vorn bei der 5., hinten bei der 4. Postnodalquerader, der Ultranolalis bei der 7. oder 8. Die Submedianquerader im Vorderflügel etwa in der Mitte zwischen der 1. und 2. Antenodalquerader, hinten etwas näher der zweiten. Der Arculus bei der 2. Antenodalquerader. Ursprung des Sector inferior trianguli deutlich vor der Submedianquerader gelegen, und zwar um etwas mehr als die Querader lang ist. Im Vorderflügel das Vierseit sehr schmal mit sehr schräger Aussenseite. Vorderseite so lang als die Innenseite, die Hinterseite stark 4mal so lang als die Vorderseite. Im Vierseit des Hinterflügels die Innenseite nur zwei Drittel der vordern, die Hinterseite kaum doppelt so lang als die vordere Seite.

Fühler schwarz, die beiden untersten Glieder hellgelb oder rötlich liniert. Gesicht hell okergelb, oliv oder rötlich, die Oberlippe mit einer medianen Punktgrube, Rhinarium oberseits breit schwarz, Nasus wieder hell, die ganze Oberseite mit breitem schwarzem Querband von einem Augenrand zum andern, in welchem die Ocellen liegen. Dasselbe lässt nur am Hinterrand, der wieder schwarz gerandet ist, eine feine helle Querbinde frei. Hinterhaupt und Unterseite sonst hellrötlich, weissgelb oder grünlich. Der ganze Prothorax tiefschwarz, das ganze Feld hexagon begrenzt, die Seiten concav. Drei Seiten des Sechsecks werden vom Hinterrand gebildet, die mittlere Seite ist sehr seicht ausgerandet, in der Mitte fast etwas eingekerbt. Vorderseite des hellrötlichen oder gelblichen Thorax mit einer sehr breiten Längsbinde. Dieselbe ist so breit

als das Hexagon des Prothorax an seiner Basis. Antalarsinus schwarz, nur die Vorderkanten hell. Sonst nur noch eine schmale Antehumeralbinde. Diese ist höchstens $\frac{1}{5}$ bis $\frac{1}{6}$ so breit als die Medianbinde. Unterseite heller. Abdomen unterseits ganz hell, oberseits mit folgenden schwarzmetallischen Zeichnungen. Segment I mit schwarzer, breiter, rechteckiger Längsstrieme. Auf Segment II im vierten Fünftel ein schwarzes, mit der Spitze nach der Basis gerichtetes Dreieck, ausserdem über dieses hinweg in der ganzen Segmentlänge eine mediane Strieme. Auf Segment III ist diese Strieme an der Segmentbasis zugespitzt, am Hinterrande aber fast so breit als das mit ihr verschmolzene Dreieck, ebenso auf Segment IV und V. Bei Segment VI und VII nimmt die schwarze Färbung so überhand, dass die ganze Oberseite schwarz ist, doch sind die Hinterecken der schwarzen Binde schräg abgestutzt. Segment VIII im vordern Drittel hell, dann etwas dunkler, ebenso das IX. Segment. Im Leben diese dunklere Stelle vielleicht himmelblau, Segment X wieder hell mit einer schmalen, an der Basis etwas eingegabelten Längsstrieme, die sich auch auf die innere Hälfte der sonst nur noch in den basalen drei Vierteln schwärzlichen obern Appendices anales fortsetzt. Segment X oben fein eingeschnitten und dort etwas erhaben. Obere Appendices stark halb so lang als Segment X, von der Seite gesehen schwarz, breit dreieckig, mit heller Spitze, die untern $\frac{3}{4}$ der obern ebenso geformt, aber ganz rötlich oder gelblich, mit einem feinen, aber langen, schräg nach oben und aussen gerichteten Dörnchen an der obern Basis. Das Dörnchen etwa halb so lang als der obere Anhang. Von oben gesehen sind die obern Anhänge kurz kegelförmig zugespitzt, etwas gespreizt, die untern mehr breit schuppenförmig, mit flach gerundeten Enden. Beine blassgelb oder rötlich, mit Ausnahme der Tarsen auf der Aussenseite fein schwarz liniert. Bedornung schwarz.

Vorkommen: Diese ausgezeichnete kleine Art wurde am 10. Februar 1901 von dem um die entomologische Erforschung Madagaskars so hoch verdienten Herrn

P. Sikora auf der Insel Réunion, wo der Forscher allzufrüh sein erfolgreiches Leben beschliessen musste, entdeckt. Über die Färbung im Leben giebt Sikora an, dass das Tierchen lichtblau sei. Diese lichtblaue Färbung rührt jedenfalls von einem hellblauen Reife her, der nun ganz verschwunden ist. Nach den genauen Angaben des Entdeckers lag das Insekt in einer Mischung von Formol und Rhum, sowie Wasser (Formol 20 gr, Wasser 500 gr). Diese Mitteilung dürfte einen wertvollen Fingerzeig abgeben, wie es möglich ist, den die Zeichnung verhüllenden Reif zu entfernen, ohne das Insekt zu schädigen. Das Tierchen liess sich noch sehr gut trocken präparieren, nur dürften etwaige blaue oder grüne Farben etwas gelitten haben.

Die Type dieser dem Andenken P. Sikoras gewidmeten niedlichen, wohl kleinsten bekannten Pseudagrion-Art befindet sich in meiner Sammlung.

Pseudagrion Sjöstedti n. sp.

♂ ad. Körperlänge 39 mm, Länge des Abdomens 33 mm, der obern Appendices anales stark $\frac{1}{3}$ mm. Flügelspannung 46 mm. Länge eines Hinterflügels $21\frac{1}{2}$ mm, seine grösste Breite im Niveau des Ursprungs des Nodal-sectors gemessen $4\frac{1}{2}$ mm. Pterostigma $\frac{4}{5}$ mm lang. Flügel hyalin, mit schwarzbraunem Geäder. Pterostigma rhomboidisch, rötlichbraun, die Innen- und Aussenseite sehr schräg, die hintere Aussenecke nur schwach entwickelt, $\frac{3}{4}$ so lang als die dahinter liegende Zelle. Vorn 12, hinten 10 Postnodalqueradern. Die Submedianquerader zwischen der 1. und der 2. Antenodalquerader, deutlich näher der ersten, der Arculus bei der zweiten Antenodalquerader. Der Mediansector entspringt im Niveau des Nodus, der Subnodalis ungefähr um die halbe Länge der 2. Postnodalzelle nach ihm, aus der schrägen Verlängerung der Nodalquerader, der Nodalsector vorn bei der 6., hinten bei der 5. Postnodalquerader, der Ultranolis bei der 8. oder 9. Querader. Ursprung des sector inferior trianguli kaum deutlich mehr vor der Submedianquerader gelegen als

diese Ader lang ist. Im Vorderflügel die Vorderseite des Vierseits so lang als die Innenseite, die Hinterseite $2\frac{1}{2}$ mal so lang als die Vorderseite, im Hinterflügel die Innenseite nur $\frac{2}{3}$ so lang als die vordere, letztere halb so lang als die Hinterseite.

Gesicht dunkel orangerot, die Oberlippe mit einer medianen Punktgrube, Rhinarium nahe dem Seitenrande mit einer feinen, schwarzen Rille, auch am Oberrande in der Grenzfurche fein schwarz. Nasus im mittleren Drittel mit einer feinen, schwarzen Querlinie, ungefähr zwischen den beiden Fühlerwurzeln. Die beiden basalen Glieder der Fühler dunkelorange, das Ende schwarz. Über das hintere Ocellenpaar eine breite schwarze, unregelmässig begrenzte Querbinde. Dieselbe läuft seitwärts ausläuferartig gegen das vorderste Ocellum, setzt sich am Augenrand nach hinten fort und umsäumt die ganze Hinterkante des Kopfes, etwas nach aussen von den beiden hintern Ocellen abgerückt, der vordere Teil der Binde durch eine schwarze feine Längs-Anastomose mit dem hintern Kopfband verbunden, sodass das orangerote umschlossene Feld in 3 etwa gleich lange Stücke eingeteilt ist. Von diesen ist das mittlere Feld schmal strichförmig, die beiden seitlichen dreieckig mit gerundeten Ecken, gegen den Augenrand breit erweitert. Prothorax orangerot, das Mittelfeld schwarz gesäumt, der Saum an der Basis nach oben winkelig einspringend, auf den Seiten der Saum sichelförmig concav nach innen bis zu den Aussenecken des Hinterrandes, die durch eine gerade schwarze Querlinie verbunden sind. Über dieser erhebt sich der flache, fast geradlinig begrenzte orangerote Hinterrand. Auf den Seiten setzt sich der sichelförmige, concave Innensaum längs des Aussenrandes des Prothorax fort, sodass dort jederseits ein rundes, orangerotes Feld abgegrenzt wird. Thorax vorn orangerot, das basale Dreieck und eine schmale Binde über den Mediankiel schwarz, ebenso eine gleichbreite Antehumeralbinde. Diese ist bei Beginn des obern Fünftels etwas abgesetzt und die innere Grenze von dort an stark convex nach innen. Seiten des Thorax

etwas grünlichgelb, eine feine schwarze Binde über jeder der beiden Nähte. Unterseite des Thorax, Interalarflecken und das erste Segment weiss bereift, letzteres mit undeutlichen schwarzen Flecken. Segment II schwarz mit einem hellen, feinen Querring nahe dem Hinterrande, die übrigen Segmente schwarz, ihre Artikulationen hell. An der Basis von Segment VIII und IX jederseits ein hellblauer schuppenförmiger Fleck. Beide Flecken von Segment VIII an der Basis verbunden, von oben gesehen die blaue Zeichnung also winkelig eingeschnitten, seitwärts erreichen die blauen Flecken $\frac{2}{3}$ der Segmentlänge. Auf Segment IX bleiben sie an der Basis breit getrennt, erreichen seitwärts auch nur kaum die halbe Segmentlänge. Segment VII—X mit kurzen weisslichen, anliegenden Härchen besetzt, die Hinterkante wie bei *Ps. serratum* Karsch jederseits des Mittelkiels mit einer Anzahl Dornzähnen bewehrt. Der Hinterrand von Segment X ausserdem schwach ausgerandet. Obere und untere Appendices anales von der Seite gesehen dreieckig-kegelförmig, die untern halbsolang als Segment X, die obern wenig kürzer, einfach. Von oben gesehen sind die obern lanzettförmig, ihre Spitze etwas von vorn und innen nach hinten und aussen abgeschrägt, die untern sind fast kreisförmig erweitert, die Erweiterung löffelförmig ausgehöhlt. Beine rötlichweiss oder okergelb, die Schenkel und die Bedornung schwarz. Unterseite des Abdomens rostgelb oder okergelb, bei den 3 letzten Segmenten dunkler.

Vorkommen: Bipindi in Kamerun.

Ein einziges ♂ in meiner Sammlung, Herrn Yngve Sjöstedt, Stockholm, dem wir die ersten biologischen Beobachtungen über die Libellen von Kamerun verdanken, gewidmet.

Pseudagrion alcicorne n. sp.

♂ ad. Körperlänge 41 mm, Länge des Abdomens 34 mm, eines Hinterflügels 24 mm, dessen grösste Breite beim Ursprung des Ultranodalis gemessen $4\frac{1}{2}$ mm. Flügelspannung 52 mm, Länge des Pterostigma $\frac{3}{4}$ mm, der

obern Appendices anales fast $\frac{3}{4}$ mm. Flügel hyalin mit schwarzem Geäder und schwarzem Pterostigma, letzteres mit einem violetten Ton, rhomboidisch, die hintere Grenzader ohne hintere Aussenecke, bogig in die äussere Grenzader übergehend, deutlich kürzer als die vordere Randader, so lang als die Aussenseite. Die hintere Randader etwa $\frac{4}{5}$ der dahinter liegenden Zelle. Vorn 17 Postnodalqueradern, hinten deren 14. Die Submedianquerader im Hinterflügel in der Mitte zwischen der 1. und 2. Antenodalquerader, im Vorderflügel kaum merklich näher der ersten. Der Arculus bei der 2. Querader: Der Mediansector entspringt vorn im Niveau des Nodus, hinten wenig vor demselben, der Subnodalis etwa ein Drittel der Länge der 2. Postnodalzelle nach dem Nodus, aus der Verlängerung seiner Querader, der Nodalsector vorn bei der siebten, hinten bei der fünften Postnodalquerader, der Ultranolis vorn und hinten bei der 9. und 10. Querader. Der Sector trianguli inferior nimmt im Hinterflügel seinen Ursprung bei der Submedianquerader, welche infolgedessen die Randader erreicht, vorn fast so viel vorher, als die Submedianader lang ist. Im Vorderflügel die Vorderseite des Vierseits so lang als die Aussenseite, die Hinterseite $2\frac{1}{2}$ mal so lang als die vordere, im Vierseit der Hinterflügel die Aussenseite $\frac{2}{3}$ der vordern, die Vorderseite kaum $\frac{2}{3}$ der Hinterseite.

Gesicht rostgelb oder okergelb, Unterlippe weisslich-gelb, Oberlippe bräunlich, ohne eine mediane Punktgrube, glänzend, die Quersfurche zwischen Nasus und Stirn schwarz. Fühler schwarz, mit Ausnahme des rostgelben Basalgliedes. Ganze Oberseite des Kopfes mit samtschwarzer Binde, deren vordere Grenze mitten über das vorderste Ocellum läuft, dieses mit einem dreieckigen Ausläufer einschliessend. Jederseits eine undeutliche helle Stelle als Postoculartleck. Nach hinten zieht sich die schwarze Färbung über das ganze Hinterhaupt, das erst wieder in der untern Hälfte rostrot wird. Schläfen hellgelb. Vorder- und Seitenrand des Prothorax hellrost- oder okergelb, sonst der Prothorax ganz samtschwarz, sein Hinterrand fast gerade, sehr schwach

gebogen, in der Mitte nicht eingekerbt. Thorax auf der Vorderseite bis zur Interalar naht der Seiten, an deren Grund noch darüber hinaus schön lila, mattviolett oder veilchenfarbig, hinter der Naht und auf der Unterseite weissgelb, etwas weiss bereift. Basaldreieck und Längs-kiel, sowie Antealardreieck schwarz, ebenso eine Schulterbinde hinter der vordern Seitenkante. Diese ist unten so breit als das schwarze Feld des Prothorax, spaltet sich aber bei Beginn des 2. Drittels in 2 Äste, der vordere, die eigentliche Fortsetzung verjüngt sich stark nach oben und ist kurz vor seiner Einmündung in das schwarze Feld des Antealarsinus nur noch $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ so breit als die Basis, seine Vordergrenze ganz geradlinig, seine hintere Grenze erst bogenförmig concav, dann parallel der vordern. Der 2. Ast verläuft längst der 1. Seitennaht, er ist sehr schmal und wenig deutlich und endet hinter der Wurzel des Vorderflügels. Eine ebenso schwache Binde auf der hintern Seitennaht, welche aber die Thoraxbasis nicht ganz erreicht. Ausserdem zu beiden Seiten des schwarzen Mediankiels der Vorderseite ein okergelbes Feld, das sich nach oben verbreitert bis zur Breite des Antealarsinus. Oberer Interalarraum schwarz und okergelb, das Hinterschildchen okergelb, schwarz gerandet. Abdomen durchaus schwarz, an der Basis etwas violett schimmernd. Das IX. und das X. Segment vielleicht violett oder lila, jedoch nicht mit Sicherheit. Unterseite hell okergelb, die mediane Längsnaht schwarz. Appendices anales schwarz, die obern fast so lang als Segment X, von der Seite gesehen aus breiter Basis breit schaufelförmig erweitert, der Hinterrand der Erweiterung zweimal ausgebuchtet, sodass 2 Endzacken und eine Mittelzacke entstehen, sodass das Ganze grosse Ähnlichkeit mit einer Geweihschaukel des Elchhirsches hat. Die oberste Zacke lang, hornförmig, fast senkrecht nach oben gerichtet, dann nach hinten gebogen, die mittlere sehr kurz, nur ein Fünftel der obern, dreieckig, die untere halbsolang aber doppelt so breit als die obere, fast wagrecht, kaum schräg nach unten gerichtet, das breite Ende gerundet, von oben gesehen, kaum merklich

über das oberste Horn hinausgespreitzt. Letzteres von oben gesehen gerade, schmal lanzettlich, die äusserste Spitze hakig einwärtsgekrümmt. Die beiden untern Appendices von oben gesehen stark $\frac{2}{3}$ der obern, breit schuppenförmig, etwas gespreitzt, mit abgerundeten Enden, oben etwas ausgehöhlt, von unten gesehen stark oval. Sie sind auf der Seite hellockergelb, wie auch beim X. Segment die okergelbe Färbung etwas weiter an den Seiten herauf reicht als beim neunten. Beine schwarz, die Hüften und Schenkelringe hellockergelb.

Vorkommen: Montagne de l'Ambre im Norden von Madagaskar, ein einziges Männchen dieser absonderlichen Art in meiner Sammlung, von Herrn Stadtrat Ficke in Freiburg i. B. freundlichst mitgeteilt.



Anhang.

Neotropische Libellen

von F. Foerster (N. 4).

Neocharis nov. gen. Calopteryg.

Flügel lang und ziemlich schmal (31:6 mm) mit sehr langem Pterostigma und gerundeter Spitze. Arculus in der Verlängerung der 2. Antenodalquerader gelegen, seine beiden Sektoren aus einem Punkte entspringend, auf seiner Mitte. Vierseits schmal und lang, mit 2 Queradern, seine untere Aussenecke punktförmig verdickt. Alle Sektoren ziemlich gerade verlaufend. Sector inferior trianguli einfach (ungegabelt), parallel dem Sector superior trianguli, eine Zellreihe zwischen beiden. Postcostalraum einzellig, selten einige Zellen vor der Mitte des Hinterflügels geteilt. Vorn 20 Antenodalqueradern, die erste um 3 Zellängen von der Flügelbasis entfernt, vor ihr noch 3 Subcostalqueradern. Die einzige Submedianquerader im Niveau der Antenodalquerader gelegen. Der Sector medianus beginnt bei 4 Zellängen, von wo der Sector principalis bogig zur Medianader aufsteigt, ohne sie ganz zu erreichen. Der Sector subnodalis entspringt nach 10 Zellängen, der Nodalsector 1 Zelle nach dem Niveau des verdickten Arculus, der Ultranodalis 7 Zellen nach dem Arculus. Im Hinterflügel entspringt der Sector medianus schon nach 3 Zellängen, der Ultranodalis nach 5—6 Zellängen. Im Niveau des Pterostigmas oder etwas davor, 2—4 Zellreihen zwischen den Sektoren in der vordern Hälfte des Flügels, in der hintern Hälfte schon teilweise vom Niveau des Nodus ab, sonst eine Zellreihe. Vorn 20—25 Postnodalqueradern, hinten 17—21. Körper an ein Megapodagrion erinnernd, etwas gedrunken. Das erste Fühlerglied

dick, wenig länger als $\frac{1}{3}$ des viel dünnern 2. Gliedes, das Endglied etwa ein Viertel länger als das 2., fein haarförmig. Unterlippe bis zum Grunde gespalten, ihre Hälften breit dreieckig etwas zangenförmig. Hinterrand des Prothorax sehr flach, bogenförmig begrenzt. Basaldreieck der Thorax-Vorderseite klein, kaum halbsolang als der Antealarsinus. Thoraxseiten sehr hoch. Abdomen fast gleichmässig dick bis zum Ende, die Basis und die vier letzten Segmente kaum dicker. Penis am Ende mit zwei langen spitzen Anhängen versehen. X. Segment beim ♂ hinten gerade abgeschnitten, kaum $\frac{1}{2}$ des IX. Segmentes, dieses $\frac{2}{3}$ des an der Basis etwas verschmälerten VIII. Segmentes. Beine ungewöhnlich lang (1 Hinterbein misst bei einer Abdomenlänge von 37 mm, 25 mm). Schenkel mit sehr kleinen, wenig zahlreichen Dörnchen besetzt, die langen Tibien besonders in der untern Hälfte mit etwas mehr und längeren Wimpern, aber alle so kurz, dass das Bein dem unbewaffneten Auge nackt erscheint. Tarsen kurz und dicht bedornt, der Klauenzahn unterhalb der Spitze sehr klein, obere Appendices einfach zangenförmig untere fehlen. ♀ unbekannt.

Diese sonderbare Gattung hat, wie schon bemerkt, grosse Ähnlichkeit mit einem riesigen Megapodagrion, sowohl was Form des Thorax als auch die langen Beine anlangt und dürfte biologisch mit Megapodagrion auch in eine Gruppe gehören. Sie gehört ferner mit *Cyanocharis* Needham unbedingt in die Gruppe der ebenfalls langbeinigen *Dicterias*. Bei *Heliocharis* und *Dicterias* sind aber die *Sectores arculi* an ihrem Ursprung weit getrennt, bei *Cyanocharis* und *Neocharis* entspringen sie aus einem Punkte des *Arculus*. Von *Heliocharis* Selys unterscheiden sich *Dicterias*, *Cyanocharis* und *Neocharis* durch den ungeaderten Basalraum. Bei *Dicterias* und *Neocharis* ist der *Sector inferior trianguli* einfach und gerade, bei *Cyanocharis* gegabelt, mit zwei Zellreihen in der Gabel. Bei *Cyanocharis* liegt der *Arculus* ungefähr im Niveau der 1. Antenodalquerader, bei *Neocharis* in oder hinter der Mitte zwischen der

1. und 2. Querader, oft fast im Niveau der zweiten, bei *Dictérias* zwischen der 2. und 3. Antenodalquerader. Es ist dasselbe Spiel, welches so oft die Unfertigkeit ächt neotropischer Libellengattungen und Arten kennzeichnet und wird es am besten sein, ein Genus *Dictérias* De Selys erweitert, anzunehmen, mit den 3 wie oben unterschiedenen Untergattungen *Dictérias* s. str. Selys, *Cyanocharis* Needham und *Neocharis* m. Auch bei *Cyanocharis* und *Dictérias* s. str. sind die Beine enorm lang und die untern Appendices anales verkümmert.

Neocharis cothurnata n. sp.

Länge des Abdomens 38 mm, eines Hinterflügels 29 mm, Geäder schwarz, das sehr lange (4 mm) Pterostigma braun, Flügel sonst hyalin, an der Spitze etwas gebräunt.

Färbung unscheinbar. Oberlippe hellolivengrün, in der Mitte mit einem viereckigen Punkteindruck. Nasus dunkler braun, oben mit rechtwinkliger Kante, auf der wagrechten Oberseite jederseits der Mitte ein Punkteindruck. Stirn flach und zurückliegend, bräunlich, die übrige Oberseite des Kcpfes mattschwarz mit einem hellolivinen Querband über die Ocellen. Seiten des Gesichtes bis zur Augennaht helloliv oder gelblich wie die Unterlippe und die Hinterseite des Kopfes.

Prothorax bräunlichrot, an der Basis des Hinterrandes in der Mitte schwärzlich, ein Dreieck der Seiten, 2 Proturberanzen des Mittelfeldes und der Hinterrand heller oliv. Vorderseite des Thorax mit schwarzer Binde über den Mittelkiel und dessen Seiten, hierauf eine olivengrüne Antehumeralbinde, die nach hinten ebenfalls braun begrenzt ist, Seitenfeld oliv mit 2 rotbraunen Binden, eine über die 1. Seitennaht und eine Interalarbinde. Beim ältern ♂ ist die Vorderseite des Thorax fast ganz braunrot. Abdomen schwarz oder schwarzbraun, erstes Segment heller oliv, oben mit braun gemischt, zweites Segment hell oliv, Oberseite und ein Längsstrich der Seiten schwarz.

Die dünnen zangenförmigen schwarzen obern Appendices an der Basis etwas verengt, mit kurzen Dornhöcker-

chen reichlich besetzt. Unter ihnen als Andeutung des untern Anhanges 2 Protuberanzen von rundlicher Gestalt, deren Enden eine bewimperte Spitze tragen. Obere Appendices kaum merklich länger als Segment X.

Beine schwarzbraun, etwas rötlich, besonders am Ende, die Hüften und die Innenseite der Schenkel hell oliv, weisslich bereift wie die Thoraxunterseite.

Typen (2 noch etwas junge Männchen) in meiner Sammlung. ♀ unbekannt. Heimat: Surinam.

